

S U P P L E M E N T U M

INDICIS ORNITHOLOGICI,

S I V E

SYSTEMATIS ORNITHOLOGIÆ.

STUDIO ET OPERA

JOANNIS LATHAM, M.D. S.R.S.

L O N D I N I :

F R O M T A T A P U D G . L E I G H , J . E T S . S O T H E B Y ,
Y O R K - S T R E E T , C O V E N T - G A R D E N .

M,DCCC,I.

Printed by Luke Hanford,
Great Turnstile, Lincoln's-Inn Fields.

S U P P L E M E N T U M.

A V E S.

D I V . I . T E R R E S T R E S.

O R D O I . A C C I P I T R E S.

G E N U S I . V U L T U R.

1.
V.

auricularis. *V. fuscus*, corpore fubtus albido, capite colloque denudatis, gula tomentosa.

L'Oricou, *Levaill. Oif.* i. p. 36. pl. 9.

Vultur auricularis, *Daudin. Orn.* i. p. 10. III.

Sociable Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 11. No. 11.

HABITAT in *Africa*, & insignis magnitudinis, lat. ped. 10. *Caput* denudatum, carnem, ut in *V. Papa*, ac nares non carunculatae. *Rostrum* & *pedes* fuscii: nidificat in rupibus a mari longe distantibus, ponens ova tria alba.

2.
V.

Kolbii. *V. pallidus*, collo denudato, torque albo, remigibus restricibusque nigris.

Le Chasse-fiente, *Levaill. Oif.* i. p. 44. pl. 10.

Vultur Kolbii, *Daudin. Orn.* i. p. 15. x.

Kolben's Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 12.

MAGNITUDO sere *V. auricularis*. Habitat in *Africa*, ubique frequenter in plateis oppidorum quisquilia colligens: cadaveribus potissimum & stercore velicitur, etiam testudinibus parvis quas integras devorat.

S U P P . II.

B

V. corpore

3.

V.

- audax.** V. corpore fusco, orbitis pallidis, pedibus lanatis nigro maculatis.
Bold Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 10. No. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*, & inter majores numerandus: victitans quadrupedibus mediocribus, & ferox intrepide etiam hominibus resistit: rostrum pallidum apice nigro.

4.

V.

- californicus.** V. niger, rostro albido, capite colloque denudatis pallidis, torquis pectorisque plumis lanceolatis,
Vultur californianus, *Nat. Msc.* v. 10. pl. 30.
Californian Vulture, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 3. No. 2.

Hæc avis magnitudine pene par *Grypho* est: torquis & pedes nigri: alæ complicatae ultra apicem caudæ extundunt.

E California in Angliam detulit hunc vulturem D. Menzies, qui conspicere posset in Museo Britannico.

GENUS II. FALCO.

1.

F.

- vulturinus.** F. niger tibiis pennatis, rostro pedibusque flavescensibus.
Le Caffre, *Levaill. Oij.* i. p. 28. pl. 6.
Falco vulturinus, *Daudin. Orn.* ii. p. 53.
Vulturine Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 15. No. 1.

HABITAT in *Africa, Caffraria*, et inter rariores habetur: magnitudo *F. Chrysaetos*, viicitat cadaveribus, hinc foetidum odorem spirans, etiam voracissimus oves invadit et capit. *Vulturibus* affinis, at collum plumis testum.

2.

F.

- bellicosus.** F. fuscus cervice varius, subtus albus, tibiis pennatis, rostro pedibusque pallidis.
Le Griffard, *Levaill. Oij.* i. pl. 1.
Falco bellicosus, *Daudin. Orn.* ii. p. 38. ii.
Marial Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 16. No. 2.

HABITAT

AVES ACCIPITRES. Falco.

iii

HABITAT in Africa, *Caffraria*: pond. 25.—30. libr. lat. ped. 7. poll. 5. fem. lat. ped. 8. poll. 7.—remiges secundæ exteriores & rectrices albido nigroque fasciatae.

3.

F.

occipitalis. F. cristatus fuscus, tibijs pennatis, macula alarum basique caudæ albo variegatæ.

Falco occipitalis, *Daud. Orn.* ii. p. 40. iii.

Le Huppard, *Levaill. Ois.* i. pl. 2.

Occipital Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 17. No. 3.

HABITAT ad Caput bone Spei: *F. Vulturino* paulo minor: *occiput* eleganter cristatum: *rostrum* cærulescens: *pedes* flavicantes.

4.

F.

Albicilla. F. obscurus, remigibus saturate fuscis, uropygio caudaque albo-cinerascentibus.
Var.

Falco albicilla, *Ind. Orn.* i. p. 9. 2. Var.?

Cinereous Eagle, *Lath. Syn.* i. p. 33. 18.—*Id. Sup.* p. 18. No. 4.

HABITAT in Nova Hollandia: habitus *albicilla*: *rostrum* nigrum: *corpus* fuscum subtus dilutius: *uropygium* & *cauda* cincero-alba: an varietas *F. albicilla*.

5.

F.

tigrinus. F. fuscus subtus albus, femoribus fusco maculatis, rectricibus alarum inferioribus nigro fasciatis.

Falco tigrinus, *Befk. Vog. Kurl.* S. 10. 11.—1 Taf. 2.—*Allg. Ueb. d. Vog.* ii. S. 676.

Tiger Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 19. No. 6.

HABITAT in Germania: magnit. *F. Cbryætos*: *cera* cærulea: *irides* & *pedes* flavi: *caput* & *pectus* fulcescens: *vertex* & *nucha* nigra: *remiges* nigriæ: *rectrices* fasciis 3 angustis nigris notatae: *ale* subtus fasciis tigrinis nigris; *sæva* & *impavida* species.

6.

F.

germani- F. rufo-albus, dorso alis caudaque fuscis, rectricibus fasciis 4 pallentibus.

Der rothlichweisse Falke, *Befk. Vog. Kurl.* S. 10. 12. a und 13. b.—*Allg. U. d. Vog.* i. Zuf. S. 676. 120.

Courland Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 19. No. 7.

HABITAT in *Germania*, *F. tigrino minor*: *cera, irides, & pedes flavi: caput, cellum, & pectus striis longitudinalibus fuscis: pennae semora tegentes apicibus macula nigra*.

7.

F.

- destruc-* *F. cristatus niger fasciis griseis, capite griseo, corpore subtus albido.*
tor. *Falco destructor, Daud. Orn. ii. p. 60. xxxii.*
Grand Aigle de la Guiane, Encycl. Method.
Destrutive Eagle, Gen. Syn. Sup. ii. p. 20. No. 9.

HABITAT in *Guiana*: long. ped. 3. poll. 2.:—*caput superius griseo-nigricans: occipitis pennae longissimae: corpus nigrum zonis subgriseis notatum: pectus & abdomen griseo-alba: remiges & rectrices nigrae: tibiae plumosae digitis flavis.*

8.

F.

- albescens.* *F. subscrivatus albus fusco varius, remigibus rectricibusque albo nigro-que fasciatis.*
Le Blanchard, Levaill. Oif. i. pl. iii.—Daudin. Ornith. ii. p. 45.
Noisy Eagle, Gen. Syn. Sup. ii. p. 21. No. 10.

HABITAT in *Africae sylvosis*, prædatur palumbis, nidificat in excelsis arboribus ova 2 ponens alba: *rostrum cæruleoscens: pedes flavicantes, tibiis lanugine alba vestitis.*

9.

F.

- ecaudatus.* *F. niger, alis pallidis, dorso caudaque breviore rufis.*
Le Bateleur, Levaill. Oif. i. p. 31. pl. 7. & 8.
Falco ecaudatus, Daudin. Orn. ii. p. 54.
Short-tailed Falcon, Gen. Syn. Sup. ii. p. 21. No. 11.

MAGNITUDO inter *F. offrögum* & *baliætum*: habitat in *Capitis Bonæ Spei* interioribus: *mas & femina* individui comites simul cädaveribus vicitant; non raro oves & gazellas prædantes: hæc avis inter volandum alas sortiter quatit, ut solet columba percussor: *cauda brevissima: corpus femina & juniori avi fuscum, remigibus caudaque nigricantibus.*

10.

F.

- Bacha.* *F. fuscus subtus albo maculatus, occipite cristato, fascia rectricum alba.*
Le Bacha, Levaill. Oif. i. p. 68. pl. 15.—Daudin. Ornith. ii. p. 43.
Bacha Falcon, Gen. Syn. Sup. ii. p. 22. No. 12.

HABITAT

AVES ACCIPITRES. Falco.

v

HABITAT in *Capitis Bonae Spei* aridis & incultis: prædatur *caviam* capensem & *lacertas*: *rostrum* & *pedes* pallide flavi.

Magnitudo *Buteonis*, pennæ verticis totius albo nigroquè variae ad occiput elongatae: *cauda* nigricans, medio fascia alba.

11.

F.

Tachardus. F. fuscus, subtus flavescens fusco varius, cauda fasciata, tibiis maculatis. Le Tachard, *Levall. Oij.* i. p. 82. pl. 19.

Falco Tachardus, *Daud. Orn.* ii. p. 164. cxxxvi.

Tachard Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 25. No. 17.

HABITAT in Africa ad ripas fluviorum, habitus *Buteonis* at minus: *cauda* longiore fusca fasciis nigricantibus: *femora* pennata: *rostrum* nigricans: *pedes* rubicundi: *F. Lagope* affinis.

12.

F.

Chicquera. F. cærulescens subtus albus, vertice nuchaque ferrugineo-rufis, cauda fascia nigra.

Falco cirratus, *Ind. Orn.* i. p. 36. Var.?

Le Chicquera, *Levall. Oij.* i. p. 128. pl. 20.—*Daudin. Orn.* ii. p. 121. xciii.

Chicquera Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 27. No. 19.

HABITUS & statura *F. cirrati*, an satis distincta: *caput* non crista-
tum: *abdomen* & *femora* fasciis plurimis abruptis: *verus apicem caudæ*
tænia lata nigra: *rostrum* flavum superius apice nigro, inferius truncatum: *pedes* flavi.

13

F.

Parasiticus. F. cauda forficata, corpore ferrugineo, cera cærulea, rostro pedibusque flavis.

Le Parasite, *Levall. Oij.* i. p. 88. pl. 22.

Falco Parasiticus, *Daudin. Orn.* ii. p. 150. cxxii.

Parasite Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 30. No. 25.

HABITAT in Africa, *Caffaria*: habitus *F. Milvi* at minor: *cauda* minus forficata: *genæ* & *gula* albida: *cauda* fusca fasciis saturationibus impavida avis, nidificat in arboribus & rupibus, ponens ova 4 rufa maculata.

F. nigricans

14.

F.

Buzon. F. nigricans rufo varius, subtus rufus, rectricibus nigris medio fascia interrupta alba.

Le Buzon, *Levaill. Oij.* i. p. 86. pl. 21.

Falco Buzon, *Daud. Orn.* ii. p. 168. cxlii.

Hobby Buzzard, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 31. No. 26.

HABITAT in *Cayana*, magnitudine *F. Cyanei*: rectrices nigricantes elongatae medio fasciola e maculis confertis: rostrum nigrum: cera lata flava: pedes flavi.

15.

F.

Bufarellus. F. fasciatus supra rufo-fuscus, subtus flavescens, remigibus nigris.

Le Bufray, *Levaill. Oij.* i. p. 84. pl. 20.

Falco Bufarellus, *Daudin. Orn.* ii. p. 168. cxli.

Buzzaret, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 32. No. 27.

HABITAT in *Cayana*, magnitudo *F. eruginosus*: rostrum nigrum: pedes flavi.

16.

F.

melanopterus. F. pedibus plumosis, corpore cæruleo-fulvo subtus albo, rectricibus alarum nigris.

Le Blac, *Levaill. Oij.* i. p. 147. pl. 36. 37.

Falco melanopterus, *Daud. Orn.* ii. p. 152. cxxiv.

Black-winged Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 28.

HABITAT in *Africa, India*: magnitudo tinnunculi: corpus pennis cæruleo-griseis vestitum margine rufis: cauda subforcipata: regio oculorum nigra: rostrum nigrum: pedes breves flavi.

Juniore ave vertex rufo varius: pennis toto-rufum.

17.

F.

vocifer. F. ferrugineo-fuscus, capite collo pectore caudaque albis.

Le vocifer, *Levaill. Oij.* i. pl. 4.

Aigle vocifer, *Daud. Orn.* ii. p. 65. xxxv.

Aigle nonette, *Gaby, Voy. en Nigritie.*

Piscivorous Eagle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 33. No. 29.

HABITAT ad *Caput Bonae Spei*, maris littora frequentans; pisces praedans uti *baleetus*, quam statura & magnitudine æmulatur: rostrum cæruleo-fulvo:

AVES ACCIPITRES. Falco.

vii

rufofuscus: pedes flavi: cauda brevis vix apicem alarum complicatarum attingit.

18.

F.

Blagrus. F. fuscus, capite collo cauda corporeque subtus toto-albis.

Le Blagre, *Levaill. Oij.* i. pl. 5.

Falco Blagrus, *Daudin. Orn.* ii. p. 70.

Blagre Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 34. No. 30.

HABITAT in Africa, ad ripas fluviatorum *Capitis Bonæ Spei*, procul a mari satis frequens: magnitudo F. vociferi: statura & moribus F. *Italiæ* et simillimus, & pariter piscibus victimans: an ejusdem varietas?

19.

F.

ranivorus. F. fuscus subtus albido varius, femoribus crissaque rufo-ferrugineis.

Le Grenouillard, *Levaill. Oij.* i. p. 95. pl. 23.

Falco ranivorus, *Daudin. Orn.* ii. p. 170. cxliv.

Ranivorous Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 35. No. 33.

HABITAT ad Cap. B. *Spei*: nidificat inter arundines, ponens ova 3—4 alba: magnitudo F. *eruginosus*: vertex nigricans: collum lateribus & bumeri albo varii: cauda elongata fasciis saturatioribus: rostrum nigrum: pedes graciles flavi.

20.

F.

testaceus. F. testaceus subtus albus, abdomine rufescente, remigibus albo maculatis, cauda alba fasciis nigricantibus.

Falco testaceus, *Daudin. Orn.* ii. p. 125. ci.

Testaceous Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 36. No. 35.

HABITAT in Java, magnitudine F. *Palumbartii*: caput & corpus totum supra fusco-testaceum: *uropygium subferrugineum*: gula & collum subtus album: *pennis testaceo-album*: abdomen rufum: remiges nigrae intus albo maculatae: cauda supra fusca, subtus albida fasciis 5 nigricantibus.

21.

F.

ornatus. F. cristatus fuscus, subtus rufo-albus, gula alba, femoribus albo nigroque fasciatus.

L'Autour huppé, *Levaill. Oij.* i. p. 114. pl. 26.—*Daudin. Orn.* ii. p. 77. xlvi.

Crested Goshawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 37. No. 38.

HABITAT

HABITAT in *Cayana*: habitus *F. Palumbarii* at major: *occiput pennis* valde elongatis nigris: lateribus colli striga nigra: *cauda elongata, rectricibus* fuscofcentibus fasciis nigris.

22.

F.

Mauduyti. *F. cristatus fasciatus*, supra fusco-nigricans, subtus albus, medio alæ cinereo-griseo.

Falco Mauduyti, *Daud. Orn.* ii. p. 73. xl.

Grand Autour de Cayenne, *Mauduit*, *Enc. Metb.*

Mauduit's Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 38. No. 39.

HABITAT in *Cayana*: long. ped. 2.—*rostrum & cera nigra*: *cauda elongata griseo & nigro quater fasciata*: *pedes flavi*.

Femina major, non cristata.

23.

F.

Guianen. *F. cristatus albus*, remigibus rectricibusque nigro fasciatis.

fis. *Falco Guianensis*, *Daudin. Orn.* ii. p. 78. xlvi.

Guiana Goshawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 38. No. 40.

HABITAT in *Guiana*: long. poll. 22.—*occipiis pennæ elongatae*, apice exterioris macula nigra: *pedes nudi, longi, flavi*.

24.

F.

rufiventris. *F. fuscus subtus rufus*, capite fusco-cinereo, gula alba lateribus rufis.

Falco rufiventris, *Daud. Orn.* ii. p. 86. liv.—*Mauduit*, *Encycl. Metb.* p. 687. col. i.

Rufous-bellied Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 39. No. 41.

HABITAT in *Cayana*, magnitudine *Nisi*: *rostrum nigrum*: *pedes flavi*.

25.

F.

hyemalis. *F. cinereo-fuscus*, subtus albus maculis ferrugineis, uropygio albo, pectore ferrugineo.

Var. *Falco hyemalis*, *Ind. Orn.* i. p. 35. 78. Var.

Falco europogistus, *Daudin. Orn.* ii. p. 110. lxxviii.

Northern Falcon, *Gen. Syn. i.* p. 79. Var. p. 39. No. 42.

HABITAT in *America*, provincia *Noveboracensi*: long. poll. 16.—*caput cinereum ferrugineo varium*: *gula alba*: *dorsum cinereo-fuscum*: *pectus ferrugineum albido varium*: *corpus subtus album singulis plumis 2 vel 3 maculis cordiformibus ferrugineis*: *cauda cinereo-fulca apice saturiore*, subtus griseo-alba fasciis fusciis obsoletis.

F. cera

26.

F.

musicus. F. *cera pedibusque rubris, corpore cæruleo-canescente, abdomine albido fasciis numerosis.*

Le Faucon Chanteur, *Levaill. Oij.* i. p. 117. No. 27.

Falco *musicus*, *Daudin. Orn.* ii. p. 116. lxxxviii.

Chanting Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 40. No. 44.

HABITAT in *Cafraria*, magnitudine *F. Communis*, coloribus *F. Cyanei*, at fasciis distincta: cauda valde cuneata rectricibus exterioribus albo fasciatis.

Mas voce canora tempore incubationis longe auditur.

27.

F.

Acoli. F. *pedibus elongatis, corpore cærulecente subtus lineato, cauda alba.*

L'Acoli, *Levaill. Oij.* i. p. 126. pl. 33.

Falco *Acoli*, *Daudin. Orn.* ii. p. 176. cli.

Long-legged Hen Harrier, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 42. No. 45.

HABITAT ad *Cap. Bone Spei* ripas fluviorum, magnitudine *F. Cyanei*, ejusdem fere coloris, at variat *pedibus & cauda longioribus: abdomen & femora albida lineis incurvis nigricantibus: uropygium albidum & cauda: rostrum nigrum: pedes flavi.*

28.

F.

axillaris. F. *corpore cærulecente subtus albo, superciliis & axillaribus nigris.*

Axillary Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 42. No. 46.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine & habitu *F. Cyanei*: *rostrum nigrum: irides fuscæ: pedes flavi.*

29.

F.

rupicolus. F. *dorso rufo maculis nigris, subtus rufo-albidus striis rufis: cauda fasciis fuscis.*

Le Montagnard, *Levaill. Oij.* i. p. 144. pl. 35.

Falco *rupicolus*, *Daudin. Orn.* ii. p. 135. cix.

Rufous-backed Kestrel, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 45. No. 49.

HABITAT ad *Caput B. Spei*: *Tinnunculus paulo major: corpus supra rufum maculis sublunatis nigris: caput rufo-fuscum: corpus subtus rufo-album striis nigris: remiges nigrae: cauda rufo-alba fasciis 6 vel 7 fuscis: rostrum nigrum: pedes flavi.*

SUPP. II.

C

F. fasciatus

AVES ACCIPITRES. Falco.

30.

F.

Subbuteo F. fasciatus supra nigricans subtus rufo-albus, genis nigris, rectricibus fuscō cinereoque fasciatis.

Falco subbuteo major, *Allg. U. d. Vog.* ii. *Zusätz.* p. 660. 29. taf. 1.—*Id.* G. N. Deutsch. ii. S. 315. 19.

Greater Hobby, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 47. No. 51.

HABITAT in *Germania* pinetis, magnitudine *Coracis*: *caput & collum fuscō-nigrum: genae nigrae: corpus supra nigro-cærulescens fasciis obsoletis fuscis, cinereo, & rufo-griseis: subtus albidum fasciis fuscis: pennis griseo similis*, at distincta avis.

31.

F.

Gabar. F. fuscus subtus griseo-cærulescens, abdomine albo fasciis fuscis.

Le Gabar, *Levaill. Oij.* i. p. 136. pl. 32.

Falco Gabar, *Daudin. Orn.* ii. p. 87. lvii.

Red-legged Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 47. No. 52.

HABITAT in *Africa* interioribus, magnitudine *F. Nisi*: *abdomen & femora alba fasciis fuscis: testrices cauda supra & infra albæ: rectrices fuscæ fasciis saturatoribus: rostrum nigrum: cera & pedes rubri*.

32.

F.

minullus. F. fuscus subtus albus, pectore striis abdomine fasciis fuscis.

Le Minule, *Levaill. Oij.* i. p. 140. pl. 34.

Falco minullus, *Daudin. Orn.* ii. p. 88. lvii.

Dwarf Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 48. No. 53.

HABITAT in *Africa*, parva avis, in hoc genere forte minima: *remiges intus albo fasciatae: cauda fasciis obsoletis: rostrum nigrum: cera & pedes flavi*.

33.

F.

tibialis. F. griseo-fuscus, gula alba, corpore subtus rufescente striis fuscis, femoribus nigris.

Le Faucon à culotte noire, *Levaill. Oij.* i. p. 126. pl. 29.—*Daudin. Orn.* ii. p. 120. xcii.

Black-thighed Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 49. No. 54.

HABITAT in *Africa* montosis: *caput superius nigricans: remiges, rectrices, femoraque nigra: rostrum cærulescens, mandibula inferiore apice truncata: cera & pedes flavi*.

34.

F.

Jackal. F. nigricans subtus albo varius, pectore caudaque brevi rufis.

Le Rounoir, *Levaill. Oij.* i. p. 73. pl. 16.

Falco Jackal, *Daudin. Orn.* ii. p. 161. cxxxiii.

Jackal Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 49. No. 55.

HABITAT ad Cap. *B. Spei*, magnitudine *Buteonis*: remiges primores fasciis pallidis, secundariae extus albæ: rectrices versus apicem macula nigra: prædatur mures, talpas.

35.

F.

Deserto-rum. F. rufus, subtus pallidus striis obsoletis, cauda fasciis obscuris, remigibus nigris.

Le Rougri, *Levaill. Oij.* i. p. 77. pl. 17.

Falco desertorum, *Daudin. Orn.* ii. p. 162. cxxxiv.

Desert Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 50. No. 56.

HABITAT in desertis *Africae*, rarius in cultis: vixitat muribus, talpis: vox *Buteonis*, magnitudine ei cedens.

Mas & femina simul prædant: rostrum & pedes flavi.

36.

F.

Nifus. F. fuscus, vertice cano, abdomine albo rufo undulato, pedibus flavis.

Falco Nifus, *Ind. Orn.* i. p. 44. 107. Var. 3.

Sparrow Hawk, *Gen. Syn.* p. 99. 85.—*Id. Sup.* p. 26. Var. C.—*Id. Sup.* ii. p. 51. No. 57.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine & facie *F. Nisi*: long. poll. 18.—nucha ferrugineo-rufa: cauda longa fasciis numeroisis pallidis: ale complicate vix ultra basin extendunt: rostrum cærulescens: irides flavi.

37.

F.

Tachiro. F. fuscus, subtus albus maculis lunatis, rectricibus fasciatis.

Le Tachiro, *Levaill. Oij.* i. p. 100. pl. 24.

Falco Tachiro, *Daudin. Orn.* ii. p. 90. lix.

Speckled Sparrow-hawk, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 51. No. 58.

HABITAT in *Africa*, ad Caput *Bone Spei*: magnitudine fere *F. Palumbarii*: caput & collum albo varia: remiges apice albæ: cauda elongata fusca fasciis saturatioribus: cera cærulescens: pedes flavi.

C 2

F. cauda

38.

F.

Sonninen. F. cauda subforcipata, corpore cinereo subtus albo, tibiis plumosis.
sis. Sonnini.

Sonnini's Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 52. No. 59.

HABITAT in *Egypto* satis frequens: longit. fere ped. 1.:—*rostrum*, *cera*, *irides*, & *pedes* flavi: *remiges* intermediae paulo breviores: *remiges* ultra apicem caudæ extendunt: *finciput* album.

39.

F.

melanops. F. supra nigricans, subtus ferrugineus lineis cinereis transversis, orbitis nigris.

Black-eyed Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 52. No. 60.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 34.:—*caput* & *cellum* cinerea: circa oculos rufum, orbitis nigris: *rostrum* nigrum.

40.

F.

radiatus. F. nigro radiato-maculatus, corpore ferrugineo, alis caudaque elongata fuscis.

Radiated Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 61. tab. 121.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 22.:—*corpus* totum læte ferrugineum, fascijs maculisque difformibus nigris: *cauda* longissima rotundata, fascijs 8, 9 nigris: *rostrum* nigrum: *pedes* cœrulei.

41.

F.

connivens. F. badius subtus flavescens maculis fuscis, cervice & axillaribus albo maculatis.

Winking Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 62.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *F. Cyanei*: *remiges* & *retrices* badio & albo fasciatæ: *tibiae* plumis testæ: *rostrum* pallidum: *irides* et *digitæ* flavi.

42.

F.

discolor. F. griseo-nigricans subtus ferrugineus, testicribus inferioribus alarum & caudæ albis.

Falco discolor, *Acad. Soc. N. H. de Paris*, i. pl. 1. p. 911. 4.

Der bunt Falke, *Allg. U. d. Vog.* ii. S. 680. 128.

Ruffy and grey Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 53. No. 63.

HABITAT in *Cayana*.

F. fuscus

43.

F.
pacificus. F. fuscus nigro maculatus, subtus flavescens lineis nigris, capite colloque albis.

Pacific Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 64.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 16—18.: rostrum, irides, & pedes flavi: cauda elongata fasciis 7 vel 8 obliquis nigris.

44.

F.
lunulatus. F. fuscus, pectore maculoso, fronte lunula colli corporeque subtus flavescensibus.

Lunated Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 65.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 12.:—gula & utrinque sub oculis flavescens: abdomen maculis crebris nigricantibus notatum.

45.

F.
clarus. F. fuscus, capite & corpore subtus albo, vertice & abdomine medio cæruleoscentibus.

Fair Falcon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 54. No. 66.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum fuscescens: irides & pedes flavi: variat nucha nigro maculata, uropygio cæruleoscente, cauda apice pallida.

GENUS III. STRIX.

* Auriculatæ, pennis auricularum instar extantium.

Str.
Strix. S. capite aurito pennis sex, corpore albo griseo fuscoque vario, torque flavescente maculis fusco-rufis.

Strix Palustris, Die Sumpfeule, *G. N. Deutsch.* 2. 344.—*Allg. Ueb. d. Vog.* i. *Zusätz.* p. 683. 16. β.—*Gr. Muß.* p. 82.

Marsh Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 58. No. 4.

HABITAT in Pomerania & Thuringia, magnitudine Coracis: long. poll. 8. lin. 10.:—corpus supra albo griseo & fusco varium, subtus magis albidum: collum circumdat torquis flavescens maculis choavæ colore notatus: cauda albida fasciis 5 obscuris.

S. capite

2.

Str.

- albifrons. S. capite aurito, corpore fusco subtus flavescente, facie alba.
White-fronted Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 58. No. 5.

HABITAT in Amer. Sept. long. poll. 8.:—*rostrum nigrum: corpus suprin ferrugineo-fuscum tectricibus alarum maculis rarioibus albis: subtus lutescens fascia pectoris fuscecente: remiges 5 primores extus secundariæ intus macula alba notata: rectrices fusce macula alba.*

Frons, gula, regionisque periophthalmicæ margo posticus alba: variat corpore minore, regione periophthalmica unicolore. *Mys. D. Davies.*

3.

Str.

- candida. S. capite laevi, corpore albo maculis alarum distantibus nigris.
La Chouette blanche, *Levaill. Ois.* i. p. 172. pl. 45.
Strix nivea, Daudin. Orn. ii. p. 190.
Ermine Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 60. No. 7.

MAGNITUDO Str. *Nyctea*, specie tamen diversa: *caput magnum corpore validiore: ale complicatae longitudine caudam superant: pedes ad ungues usque lanati: rostrum nigrum.*

4.

Str.

- Choucou. S. pallide fuscus subtus albus, cauda cuneata lineis transversis albis.
Le Choucou, *Levaill. Ois.* i. p. 151. pl. 38.
Strix Choucou, Daudin. Orn. ii. p. 196.
Falconine Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 61. No. 9.

HABITAT in Africa: habitus Str. *Funereæ*, capite parvo accipitrino: regio periophthalmica & narium alba: *cauda longa cuneiformis, rectricibus exzus lineis 10—12 transversis albis notatis: rostrum parvum, nigrum.*

5.

Str.

- nifuella. S. corpore fusco rufo alboque vario, cauda cuneata, pennis periophthalmicis apice nigris.
Le Choucouhou, *Levaill. Ois.* i. p. 157. pl. 39.
Strix nifuella, Daudin. Orn. ii. p. 187.
Variegated Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 62. No. 10.

HABITAT

AVES ACCIPITRES. *Strix.*

xv

HABITAT in *Africa*, magnitudine *Str. Otus*: *corpus fuscum supra maculis rufo-nigricantibus & albis, subtus lunulatis varium: facies albida, apicibus pennarum nigris.*

6.

Str.

Huhula. *S. albo fasciata corpore cinereo, aliis fuscis, cauda fasciis tribus albis.*

Le Huhul, Levaill. Oif. i. p. 167. pl. 41.

Strix Huhula, Daudin. Orn. ii. p. 190.

Fasciated Owl, Gen. Syn. Sup. ii. p. 62. No. 11.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *Str. Ullule*: *corpus cinereum lineis numerosis transversis albis, subtus undulatum albido fasciatum: cauda cuneata fasciis tribus obliquis albis: rostrum, irides, & pedes flavi.*

7.

Str.

griseata. *S. varia, corpore supra fusco rufoque, subtus rufo-alba, tectricibus alarum caudaque albo maculatis: superciliis albis.*

La Chouette à Aigrette blanche, Levaill. Oif. i. p. 169. pl. 43.

Strix griseata, Daudin. Orn. ii. p. 207.

Supercilious Owl, Gen. Syn. Sup. ii. p. 63. No. 12.

HABITAT in *Guiana*, magnitudine *Str. Otus*: *regio periophthalmica vix conspicua, supra oculos vitta alba ad axillas utrinque fere ducta: rostrum mediocre flavum: pedes nigricantes.*

8.

Str.

Georgica. *S. fasciata capite lœvi, corpore fusco subtus albo, regione periophthalmica albo annulata.*

Georgian Owl, Gen. Syn. Sup. ii. p. 64. No. 13.

HABITAT in *Georgia Americana*: long. poll. 16 $\frac{1}{2}$.:—*magnitudo Str. Flammæ: rostrum flavum: gula & pettus fuscum fasciis albidis: abdomen albidum maculis fusco-rubris: femora albida punctis nigricantibus.*

9.

Str.

Boobook. *S. capite lœvi, corpore supra fusco subtus ferrugineo longitudinaliter maculato.*

Boobook Owl, Gen. Syn. Sup. ii. p. 64. No. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Stridule*: *corpus supra fusco-ferrugineum maculis flavescensibus: gula flava rufo maculata.*

S. capite

10.

Str.

nudipes. S. capite laevi, corpore supra fusco albo maculato, subtus albo maculis lyriformibus fuscis.

Strix nudipes, Daudin. *Orn.* ii. p. 199.

Bare-legged Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 65. No. 16.

HABITAT in *Cayana*: long. poll. 7.:—*corpus supra fulvo-fuscum, macula lateribus colli alba: testrices alarum minores albo maculatae: corpus subtus album striis longitudinalibus fuscis: pedes nudi, fuscii.*

11.

Str.

phalænoi- S. capite laevi, corpore fulvo, testricibus alarum inferioribus albo macu- des. latis, subtus albo rufoque vario, pedibus hirsutis.

Strix phalænoides, Daudin. *Orn.* ii. p. 206.

Booted Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 66. No. 17.

HABITAT in *America insula Trinitatis*: longit. poll. 6.:—*rostrum nigricans: testrices alarum inferiores maculis 6 albis notatae: corpus subtus & gena albo & rufo variae: tibiae & digitii plumosi rufescentes.*

12.

Str.

Tengmalmi. S. capite laevi, corpore fusco-albo vario, vertice & genis albo punctatis.

Strix Tengmalmi, *Ind. Orn.* i. p. 64. 42. Var?

Var.

Le Chevchette, *Levaill. Oij.* i. p. 176. pl. 46.

Strix Pusilla, Daudin. *Orn.* ii. p. 205.

Dwarf Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 66. 18. Var.

HABITATIO dubia, *Str. Pafferina Minor*: *corpus fuscum, subtus albo varium: vertex & gena sub oculis punctis numerosis albis: regio oculorum & gula alba: remiges albo maculatae vix basin caudae attingunt: varietas Str. Tengmalmi.*

13.

Str.

Sinenfis. S. capite laevi, corpore supra castaneo ferrugineo vario, gula alba, ab domine lineis transversis obscuris.

China Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. Add. p. 368.

HABITAT in *Chbna*: long. poll. 17.:—*nucha & cervix maculis albis & nigris notata: remiges & testrices fasciis fusco-castaneis.*

S. capite

14.
Str.

undulata. S. capite levi, corpore rufo-fusco, abdomine albo undulato, testicibus
alarum remigibusque albo marginatis.
Undulated Owl, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 368.

HABITAT in Insula Norfolk maris Pacifici : long. poll. 12. :—*rostrum*
validiusculum cæruleum : *pedes nudi flavi.*

ORDO II. P I C Æ.

GENUS IV. LANIUS.

1.

L.
collaris. Lanius collaris, *Ind. Orn.* i. p. 69. 10.
Le Fiscal, *Levaill. Oij.* ii. p. 35. pl. 61. 62.
Collared Shrike, *Latb. Syn.* i. p. 163. 7.—*Id. Sup.* ii. p. 68. No. 1.

HABITAT ubique in Africa.

2.

L.
Collurio. Lanius Collurio, *Ind. Orn.* i. p. 69. 11.—*Spalowjk. Vog.* 2. tab. 5.—
Hift. Prov. ii. p. 335.
L'Ecorcheur male & de jeune age, *Levaill. Oij.* ii. p. 50. pl. 64.
Red-backed Shrike, *Gen. Syn.* i. p. 167. 25.—*Id. Sup.* ii. p. 69. No. 2.

HABITAT ad Cap. B. Spei : in Egypto.

3.

L.
picatus. Lanius picatus, *Ind. Orn.* i. p. 73. 20.
Lanius Leverianus, *Muf. Lev.* p. 241. t. 59.
Corvus Collurio, *Daud. Orn.* ii. p. 246.
La Pie Piegrische, *Levaill. Oij.* ii. p. 33. pl. 60.
Magpie Shrike, *Gen. Syn.* i. p. 192. 49.—*Id. Sup.* i. p. 54.—*Id. Sup.* ii.
p. 70. No. 3.

HABITAT in Cayana.

SUPP. II.

D

L. fuscus

4.

L.

- torquatus.** L. fuscus subtus albo nebulosus, loris ferrugineis.
Clouded Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 73. No. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum cærulescens*: *cauda elongata*.

5.

L.

- dubius.** L. cinereus cauda cuneiformi, uropygio tectricibusque caudæ apice coccineo striatis.
Dubious Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 73. No. 11.

HABITATIO dubia: longit. poll. 8.—*rostrum &c pedes flavi*: *cauda valde cuneata*.

6.

L.

- robustus.** L. cinereo-cæruleus, capite collo remigibus fasciaque caudæ nigris.
Robust Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 74. No. 12.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine corporis ultra *Excubitorum*: longit. poll. 21.:—*caput, collum, & initium pectoris nigra*: *cauda elongata* versus apicem tænia lata nigra.

7.

L.

- erectus.** L. virescens subtus flavicans, capite tumido colloque nigris, rostro pedibusque flavis.
Erect Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 74. No. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *caput* pennis elongatis tectum, unde crista erecta: *caput* ultra oculos utrinque & *cervix nigra*: at *gula & totum corpus* subtus flavescens.

8.

L.

- frontatus.** L. cristatus fuscus, subtus flavus, capite colloque nigris, lateribus vittis duabus albis.
Frontal Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 14. tab. 122.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Collurionis*: *rostrum* validum nigrum: *caput* tumidum pennis erctis: linea alba a fronte utrinque descendens lateribus maxillæ: altera pone oculum.

L. corpore

9.
L.

flavigaster. L. corpore supra fusco subtus flavo, capite supra rostro pedibusque nigris.

Yellow-bellied Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Excubitoris*: *caput* subcristatum, ultra oculos nigrum: *cauda* subcuneiformis.

10.
L.

rubigino-sus. L. ferrugineus subtus flavescens, sincipite subcristato, genis maculatis.

Lanius ferrugineus, *Act. de la Soc. D'Hist. Nat. de Paris*, v. i. part i. p. 911.

Rusty Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 75. No. 16.

HABITAT in *Cayana*: *corpus* totum supra saturate ferrugineum, subtus flavescens: *remiges* intus nigrae: *sincipitis pennæ elongatæ ferrugineæ*: *occiput* & *genæ* maculatae.

11.
L.

Afer. L. niger subtus albus, dorso maculato, linea suboculari albo, medio alarum macula rufo-alba.

African Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 76. No. 17.

Habitat in *Senegala*: magnitudo *L. Nevii*, cui similis, at distincta avis: linea alba a naribus utrinque sub oculis ducta fere ad nucham.

12.
L.

myctaceus. L. fusca, corpore subtus caudaque rubris, fascia pectoris strigaque sub oculis albis.

La Pie griesche rouge à plastron blanc, *Levaill. Oij.* ii. p. 55. pl. 65.
Mustachœ Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 76. No. 18.

MAGNITUDO *Merule*: longit. poll. 10:—*cauda* elongata cuneiformis: *remiges* 2 majores intermedie extus rubrae: *rostrum* & *pedes* nigritantes in nonnullis: *remiges* 2 extus albæ.

13.
L.

pendens. L. niger, corpore supra cinereo, abdomine vittaque supra infraque oculos alba.

Le Pendeur, *Levaill. Oij.* ii. p. 58. pl. 66. 1.
Cruel Shrike, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 77. No. 19.

HABITAT in India, magnitudine *Lan. Rutili*: *vertex, nucha, dorsum cæruleo-grisea: abdomen album: cauda cuneiformis, rectricibus 4 intermediiis nigris, reliquis albo nigroque dimidiatis.*

14.

L.

- Superciliosus.** *L. rufus subtus albidus, striga per oculos nigra, superciliis albis.*
Le Rousseau, Levaill. Oij. ii. p. 60. pl. 66. f. 2.
Supercilious Shrike, Gen. Syn. Sup. ii. p. 77. No. 20.

HABITAT in insula Java, magnitudine *Rutili*: *corpus supra ferrugineo-rufum: fusciput album supra oculos in linea ductum, per oculos vitta nigra: corpus totum subtus rufo-albidum: remiges nigrae: cauda cuneiformis.*

15.

L.

- Brubru.** *L. niger, corpore supra albo vario subtus albo, superciliis albis, lateribus ferrugineis.*
Le Brubru, Levaill. Oij. ii. p. 85. pl. 71. f. 1. 2.
Cape Shrike, Gen. Syn. Sup. ii. p. 78. No. 21.

HABITAT *C. Bonei Spei* interioribus: longit. poll. 5 $\frac{1}{2}$.:—in mimosis nidificat, ova ponens 5 alba fusco maculata: *femina fusca ubi mas niger.*

16.

L.

- Cubla.** *L. niger, corpore subtus fascia tectricum uropygioque albis, cauda apice alba.*
Le Cubla, Levaill. Oij. ii. p. 89. pl. 72. f. 1. 2.
Hottniqua Shrike, Gen. Syn. Sup. i. p. 79. No. 23.

HABITAT in Africa, ad *Cap. B. Spei*: longit. poll. 6.:—vistitat infectis, larvis, pupis: *femina magis obscura ad fuscum inclinans.*

GENUS V. PSITTACUS.

I.

Pf.

- Tabuenfis.** *P. macrour. viridis, capite collo corporeque subtus coccineis, uropygio cæruleo.*
Var. γ . *Tabuan Parrot, White's Journ. tab. p. 168. 169.—Gen. Syn. Sup. ii. p. 82. No. 2. β .*

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo & habitus *Pf. Tabuenensis*: cauda elongata at vix cuneata.

2.

Pf.

- Narcissus.** *P. macrour. luteus, collari albido, capite maculaque axillari coccineis.*
Jonquil Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 83. tab. 123.

HABITAT in *Bengala*, magnitudine *Pf. Rufirostris*: caput rubro-coccineum: collare albidum postice dilute viride: corpus totum late flavum: remiges apice pallidæ: macula axillaris coccinea: rostrum & pedes obscure carnei.

3.

Pf.

- pallidus.** *P. macr. flavus, alis albidis rosaceo leviter tinctis, virescentaque pro luce variatis.*
Psittacus pallidus, *Nat. Mjſc.* pl. 258.
Pale Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 84. No. 6.

4.

Pf.

- eximus.** *P. macrour. viridis, capite collo crisoque coccineis, rectricibus alarum cæruleis, gula alba.*
Psittacus eximus, *Nat. Mjſc.* pl. 93.
Nonpareil Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 85. No. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pf. Pennantii*: dorsi pennæ medio macula nigra notatae: bumeri nigri: rectrices alarum minores paleæ cæruleæ.

5.

Pf.

- pulchellus.** *P. macr. viridis subtus luteus, capistro aliisque cæruleis.*
Psittacus Pulchellus, *Nat. Mjſc.* pl. 96.
Turcosine Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 89. No. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*: caput pallide cæruleum, nucha fuscescente: ala totæ cæruleæ, axillis coccineis: cauda valde elongata.

6.

Pf.

- discolor.** *P. macrour. viridis, rectricibus basi ferrugineis, humeris subtus sanguineis.*
Red-shouldered Parrakeet, *Phill. Voy.* i. p. 269.—*White's Journ.* tab. p. 263.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 15.

HABITAT

HABITAT in *Nova Wallia Australi*, magnitudine *Pf. Pullarii*: long. poll. 10 f.: —*facies tota cum gula coccinea: vertex cæruleus: cauda valde cuneiformis basi castanea apice cærulecente.*

7.

Pf.

pyrrhocercus. *P.* submacr. viridis, vertice cærulecente, humeris testicribusque alarum inferioribus aurantiis.

Orange-winged Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 16.

HABITAT in *Braßilia*: long. 7—8 poll.—*rostrum nigrum: pedes pallidi.*

8.

Pf.

nigricollis. *P.* macrour. viridis, collo subtus nigro, loris lineaque lateribus colli albis.

Black-necked Parrakeet, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 90. No. 17.

HABITAT in *Braßilia*: *incipit & orbitæ sulphureæ: gula & pectus nigra: lateribus colli linea longitudinalis alba: remiges & rectrices nigrae marginibus cæruleis.*

9.

Pf.

verticalis. *P.* macrourus viridis, vertice medio rubro, remigibus cæruleis.

Red-topped Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 369.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 18.—nimis affinis *Psittaco Pacifico*, at multo major.

10.

Pf.

funereus. *P.* brachyr. niger, cauda medio melina nigro imbuta.

Psittacus funereus, *Nat. Hist.* pl. 186.

Banksian Cockatoo, Var. A. *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 91. No. 18. C.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pf. Banksi*, cuius forte varietas: *cauda non coccinea nigro fasciata, sed melina, punctulis parvulis nigris creberrimis irrorata.*

11.

Pf.

Levailant. *P.* viridis varius, humeris femoribusque aurantiis.

Levaillant's Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 95. No. 28.

HABITAT ad *Cap. Bonæ Spei*: magnitudine *Pf. Erythrocephali*.

12.

Pf.

solitarius. P. brach. viridis, abdomine purpureo-cæruleo, capite collo corporeque
fubtus coccineis.

Solitary Parrot, *Gen. Syn. Sup.* i. p. 65.

HABITAT in insulis *Maris Pacifici*, magnitudine *Sturni*: *rostrum* &
pedes flavescentes: *cauda* brevis.

13.

Pf.

galeatus. P. brachyr. cristatus fusco-viridis, vertice rubro, abdomine rubro viri-
dique undulato.

Red-crowned Parrot, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 369.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Pf. Eritboci*: long. poll.
13. :—*rostrum* flavescens: *pedes* obscuri: *femina*, uti *mas*, vertice cris-
tato minime rubro: *corpus* ei coloribus magis splendentibus undula-
tum.

G E N U S IX. B U C E R O S.

1.

B.

Abyssinicus. B. *Abyssinicus*, *Ind. Orn.* i. p. 143. 4.

Abba Guimba, *Bruce's Trav.* v. iii. p. 102. & *App. tab.* p. 169.

Abyssinian Hornbill, *Gen. Syn.* i. p. 347. 4.—*Id. Sup.* ii. p. 99. No. 1.

HABITAT in *Abyssinia*: long ped. 3. poll. 10. lat. ped. 6.:—nidificat
in arboribus, vicinitat scarabæis, an eadem avis cum *B. Africano*.

2.

B.

ruber. B. *ruber*, capite nigro, fascia dorsali alba.

Crimson Hornbill, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 100. No. 4.

SPECIES dubia, magnitudinis incertæ: *rostrum* elongatum validum
verhus apicem incurvum nigricans, basi albido: *pedes* nigricantes:
caput nigrum, tumidum: *corpus* cum aliis & *cauda* rubrum, fascia dorsi
ante alas alba: *cauda* cuneiformis.

3.

B.

galeatus. B. fronte gibbosa subquadrata, corpore nigro, abdomine caudaque cunei-
formi albis, fascia rectricum nigra.

Buceros

Buceros galeatus, *Ind. Orn.* i. p. 142. 2.

Helmet Hornbill, *Gen. Syn.* i. p. 343. 2.—*Id. Sup.* ii. p. 370.

HABITAT in *Afia*: *pedes robusti, nigri.*

GENUS XI*. MUSOPHAGA.

Rostrum crassum, trigonum, mandibula superiore basi supra verticem elevata, maxillis dentatis.

Nares in medio rostri.

Lingua integra crassiuscula.

Pedes ambulatorii.

M.

violacea. M. cæruleo-atra, striga aurium alba, rostro remigibusque sanguineis.

Musophaga violacea, *Schr. d. Berl. Gesell.* ix. S. 16. taf. 1. D. *ifert.*

Cuculus regius, *Mus. Lev.* pl. in p. 167.

Violet Plantain-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 104. tab. cxxv.

HABITAT in *Africa, Guinea*: long. poll. 19.:—*rostrum* flavissimum, maxillis utrinque dentatis apice coccineum: *loræ* violaceæ: sub oculis linea albida: *collum, pectus, corpus* violaceum: *ale* violaceæ: *remiges* primariae medio utrinque purpureo-coccineæ: *cauda* elongata cunciformis: *pedes* nudi, nigri.

GENUS XIII. CORVUS.

I.

C.

melanops. C. cinereus, facie juguloque nigris, rectricibus lateralibus apice nigris. Black-faced Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Glandarii*: *rostrum* nigrum: *pedes* cærulescens: *corpus* cæruleo-cinerascens: *remiges* nigritantes.

C. cinerascens

- ^{2.}
C.
melano- C. cinerascens, corpore subtus albo, facie jugulo pectore margine ala-
gaster. rum remigibus rectricibusque nigris.
Black-breasted Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

HABITAT in *Nova Hollandia*: an præcedentis varietas?

- ^{3.}
C.
Caledoni- C. niger, cauda cuneiformi, collo toto pectoreque albis.
us. Magpie of New Caledonia, *D'Entrec. Voy.* ii. p. 226, pl. 35.—*Gen. Syn.*
Sup. ii. p. 116. No. 19.

HABITAT in *Nova Caledonia*: longit. poll. 20.:—*rostrum* nigrum
apice flavescens: *cauda* valda cuneiformis.

- ^{4.}
C.
vericolor. C. cœruleo-fuscens rubro varians, cauda cuneiformi apice alba.
Variable Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia*: speciosa avis & inter majores nume-
randa: *corpus* fuscens rubro & cœruleo splendens: *rostrum* validum
& *pedes* nigri.

- ^{5.}
C.
cyanoleu- C. cyaneo alboque varius, rostro pedibus remigibusque fuscis.
cus. Blue and white Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 22.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*, magnitudine *Pica*: *facies* cum
gula, latera colli, tectrices alarum interiores, *uropygium*, *cauda* fere
tota, & *corpus* inferius alba: *caput* superius, *nucha*, *dorsum*, *ale*, & *rec-*
trices versus apicem nigro-cœrulea: *irides* fuscae.

- ^{6.}
C.
melanoleu- C. niger, *gula* *uropygio* criso remigibus rectricibusque exterioribus
ucus. medio nigris.
Black and white Crow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 117. No. 23.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: long. poll. 20.:—*irides* cœ-
ruleæ.

SUPP. II.

E

C. olivaceus,

7.

C.

olivaceus. C. olivaceus, capite & corpore subtus nigris, macula aurum pectorisque
albis,
White-checked Crow, Gen. Syn. Sup. ii. p. 118. No. 24.

HABITAT in Nova Hollandia: caput tumidum: remiges ferrugineæ:
cauda cuneiformis rectricibus extimis apice albis.

8.

C.

rufigaster. C. cœruleo-niger, cauda cuneiformi, abdomine crissō & femoribus car-
neis.

La Pie à Culotte de Peau, Levaill. Oij. ii. p. 20. p. 55.
Rufous-bellied Crow, Gen. Syn. Sup. ii. p. 118. No. 25.

HABITAT in partibus meridionalibus, magnitudine Merulae: cauda
cuneiformis valde elongata: abdomen & femora carneo-rufa: rostrum &
pedes nigricantes.

9.

C.

varians. C. sericeo-niger viridi-purpureo varius, cauda cuneiformi elongata.

Le Temia, Levaill. Oij. ii. p. 22. pl. 56.

Changeable Crow, Gen. Syn. Sup. ii. p. 119. No. 26.

HABITAT in Java, magnitudine Turdi musici: corpus totum plumis
nigris tectum, viridi & purpureo pro luce variantes: cauda valde elon-
gata, rectricibus 4 intermediis æqualibus, exterioribus gradatim brevio-
ribus.

10.

C.

Paradox. C. fusco-griseus subtus albido, abdomine medio flavo, lateribus colli ca-
rus. runcula cylindracea.

Corvus paradoxus, Daudin. Orn. ii. p. 246. pl. xvi.

Wattled Crow, Gen. Syn. Sup. ii. p. 119. No. 27.

HABITAT in Nova Zealandia: longit. poll. 15.:—rostrum nigrum:
gula alba: cauda cuneiformis: remiges & rectrices apice albæ.

1.

C.

Sagittata. C. corpore striato, supra olivaceo subtus albo, genis cinerascentibus.
Striated Roller, Gen. Syn. Sup. ii. p. 122. No. 4.

HABITAT

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: longit. poll. 15.:—*remiges secundariae griseæ, majores nigrae: cauda cinerea: rostrum carneum: pedes cærulei.*

2.

C.

- Tibicen. C. niger, nucha tectricibus alarum crasso caudaque (excepto apice) albis.

Piping Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 122. No. 5.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: long. poll. 18.:—*rostrum apice incurvum, cæruleum apice nigro: pedes cinerei.*

3.

C.

- militaris. C. coccinea, remigibus caudaque subtus nigricantibus.
Coracias militaris, *Muf. Lev.* p. 61. tab. in pag. 63.
Crimson Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 122. No. 6.

HABITAT in *Cayana*, magnitudine *Corvi*: *rostrum rubrum: pedes nigricantes: pulcherrima avis.*

4.

C.

- pilosa. C. testacea striis longitudinalibus albis, dorso fuscō, remigibus caudaque cæruleis.
Hairy Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 123. No. 7.

MAGNITUDINIS incertæ hæc avis: habitat forte in *Africa*: *rostrum & pedes cæruleentes: dorsum & ale purpureo splendentes: supra oculos stria alba, per oculos nigra: pennæ abdominis striatæ elongatae.*

5.

C.

- scutata. C. nigra, jugulo pectoraliter coccineis.
Coracias scutata, *Muf. Lev.* p. 197. tab. p. 199.
Red-breasted Roller, *Lev. Muf.* p. 199. pl. p. 199.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 123, No. 8.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: long. poll. 18.:—*cauda rotundata: rostrum nigricans subtus pallidum: pedes nigri.*

6.

C.

- pacifica. C. viridis, capite castaneo, alis caudaque cæruleis, remigibus basi albis.
Pacific Roller, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 371.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 9.:—rostrum & pedes rubri: gula cærulea, lateribus albo marginata.

GENUS XV. ORIOLUS.

O.

Cartage- O. fuscō rufoque varius, corpore subtus uropygioque flavis, capite nigro, superciliis gulaque albis.

Coracias Cartagenensis, *Scop. Ann.* i. p. 40.

Carthagena Oriole, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 126. No. 5.

HABITAT in *Cartagena*, magnitudine *Or. Galbula*: ale caudaque rufæ nigro maculata: rostrum nigrum.

GENUS XVI. GRACULA.

I.

G.

Abyssini- G. viridis, abdomine ferrugineo, capite cinerascente.
ca. Abyssinian Grackle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 128. 4.

HABITAT in *Abyssinia*: an var. *Grac. Atibis*.

2.

G.

viridis. G. viridi-olivacea subtus albida, gula abdomineque maculis fuscis, cauda apice alba.
Green Grackle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 129. 5.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 11.:—rostrum apice subincurvatum corneum: lingua subulata.

3.

G.

melanocephala- G. griseo-cerulescens subtus alba, capite nigro, fronte fascia que tectri-
phala. cum albis,
Black-headed Grackle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 129. 6.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 9.:—rostrum & pedes flavi.

G. corpore

- G.**
picata. G. corpore superiore fasciaque pectorali nigris, subtus fasciaque duplice
alarum albis.
Pied Grackle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 130. 7.
- HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 10.:—*rostrum* flavum:
pedes grisei: *facies tota cum gula alba*.

- G.**
cyanotis. G. viridis subtus alba, vertice nigro postice albo, regione oculorum &
aurium cæruleis.
Blue-eared Grackle, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 130. 8.
- HABITAT in *Nova Hollandia*: long. 11 1/2. poll.:—*rostrum* & *pedes*
nigri: *gula* & *jugulum* medio cæruleo-grisea.

GENUS XVIII. T R O G O N.

- T.**
Leverianus. T. violaceus viridi-aureo nitens, alis nigris, abdomine albo, remigibus
tribus exterioribus nigris apice albis.
Trotogon Leverianus, *Muf. Lev.* p. 175. tab. p. 177.
Leverian Curucui, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 131.
- HABITAT in *America Australi*, magnitudine *Tr. violacei*, cui nimis
similis.

GENUS XX. C U C U L U S.

- C.**
cupreus. C. aureo-cupreus, abdomine femoribusque flavis.
Cuculus cupreus, *Muf. Lev.* t. in p. 159.
Cupreous Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 134.
- HABITAT in *Africa*, magnitudine fere *Alauda*: *corpus supra & col-*
Ium plumis cupreis & versicoloribus testum, *subtus cum pectore pulchre*
flavum: *cauda longiuscula, rectricibus exterioribus ad apicem macula*
triangulari notatis: *rostrum & pedes nigri*.

2.

C.

clamofus. C. ex toto fuscō-nigricans.Cuculus criard, *Levail. Voy.* (ed. 8vo.) ii. p. 6.Noisy Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 136. No. 7.HABITAT *Capitis B. Spei* interioribus: cantus varius & continuo repetitus longe auditur.

3.

C.

cyanoce-phalus. C. maculatus supra fuscus subtus albus, capite colloque supra nigro-

cyanis, gula rufa.

Blue-headed Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 137. No. 8.HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 9.:—*rostrum* & *pedes* cærulescentes: *dorsum* maculis albidis notatum: latera abdominis lineis transversis nigris.

4.

C.

phætianius. C. niger, corpore supra caudaque rufo flavo nigroque variis, rectricibus elongatis.Pheasant Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 137. No. 9.HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 18.:—*corpus* variegatum: *cauda* elongata fasciis numerosis: *ungues* postici elongati fere recti.

5.

C.

palliolatus. C. corpore virescente subtus albo, lateribus collī tænia obliqua nigra. Tippet Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 10.HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. fere 12.:—*vertex* subcrisatus: *caput* ad oculos usque nigrum: *cauda* brevis, *rectricibus extus* albo maculatis.

6.

C.

flabellifor-mis. C. cauda cuneiformi, corpore nigro subtus fulvo, rectricibus lateralibus intus nigro alboque fasciatis.Fan-tailed Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 11. tab. 126.HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi*: *caput*, *corpus* superius, alaque nigra: *rostrum* nigrum: *pedes* flavi.

C. rufa

7.
C.
plagiosus. *C. rufo-purpureus*, subtus albidus tenuis transversis fusco-auratis, rostro pedibusque flavis.
Glossy Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 138. No. 12.
HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum fuscum*: *pedes pallidi*.

8.
C.
Abyssini- *C. fuscus* subtus albidus, remigibus rectricibusque apice albis, pedibus tridactylis.
Bee Cuckow, Moroc, *Bruce's Trav. App.* t. p. 178.
Abyssinian Cuckow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 139 No. 13.
HABITAT in *Abyssinia*: longit. poll. 7.:—victitat apibus.

GENUS XXII. P I C U S.

1.
P.
icterocephal- *P. olivaceo-fuscus*, capite flavo, pileo rubro, corpore subtus albido fasciis interruptis fuscis.
Phalus. Yellow-headed Woodpecker, var. ? *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 141. No. 5.
Var. AN varietas *Pic. Icterocephali*: *gula tota maculis rubescens notata*: *corpus subtus maculis subincurvatis fuscis*.

2.
P.
aktivolans. *P. fusco-ruber*, pileo gulaque cæruleo-viridibus, lateribus collи flavo variis.
Picus aktivolans ex Guinea, *Ger. Orn.* ii. p. 49. t. 173.
Guinea Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 141. No. 6.

HABITAT in *Guinea*: hujus avis præter imaginem & nomen non aliam in *Geriniana* ornithologia invenimus notitiam: affinis *Galbulæ*.

3.
P.
Mahrat- *P. niger* albo varius, subtus fuscus maculatus, uropygio albo, abdomine medio rubro.
tenis. Mahratta Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 142. No. 7.
HABITAT in *India*: *Pic. Minore* paulo major: *corpus subtus a gula fuscum maculis saturioribus*: *remiges & rectrices nigrae albo maculatae*.
P. rufus

4.
P.

pectoralis. P. rufus nigro undulatus, abdomine rufescente nigro maculato, fascia pectorali nigra.

Gorget Woodpecker, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.

HABITAT in *Nova Zealandia*: long. poll. 9.:—cauda nigra.

GENUS XXIV. ALCEDO.

A.

azurea. A. saturate cærulea, corpore subtus lorisque flavescens, lateribus colli macula obliqua alba.

Azure King's-fisher, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.

HABITAT in insula *Norfolk Maris Pacifici*: magnitudo *Ispida*: rostrum nigrum: pedes rubri.

GENUS XXV. SITTIA.

S.

chrysoptera. S. cinerea subtus albida, alis caudaque fuscis, remigibus medio aurantio-
ra. ferrugineis.

Orange-winged Nuthatch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 146. 3.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *S. Surinamensis*: rostrum
fuscum: pedes plumbei.

GENUS XXVI. TODUS.

T.

Rubecula. T. cinereus, gula pectoraque aurantiis, abdomine albo.
Red-breasted Tody, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 147. 2.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Emb. Citrinelle*: vertex
subcristatus: rostrum obscurum, basi vibrissis instructum: lingua bifida.

GENUS

GENUS XXVII. MEROPS.

1.
M.

superbus. M. ruber, fronte gula uropygioque cæruleis, rectricibus duabus intermediiis longioribus.

Merops *superbus*, *Nat. Misc.* tab. 78.

Superb Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 6.

HABITAT in *America Australi*? longit. poll. 9.:—*M. Brasilienſi* valde affinis.

2.
M.

orientalis, M. viridis, rectricibus mediis elongatis, remigibus rubris apice nigris.

Eastern Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 7.

HABITAT in India, magnitudine *Erythropoteri*.

3.
M.

cæruleo- *M. cæruleo-viridis* nigro varians.

cens. Blue-green Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 8.

HABITAT *dubia*: longit. poll. 8.:—*pedes* nigri.

4.
M.

cucullatus. M. fusco-plumbeus subtus albidus fusco lineatus, cucullo verticali per oculos ducto nigro.

Hooded Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 152. 9.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. 9.—10. poll.:—*rostrum & pedes* flavescentes: *abdomen* album: *remiges* 5—6 intermediae medio viridi-flavantes: *cauda* plumbea apice albida.

5.
M.

chrysopter- *M. fuscus*, macula alarum fulva, remigibus rectricibusque exterioribus apice albis.

Golden-winged Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 153. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 12.:—*cauda* cuneiformis fusa: *rostrum & pedes* nigri: vittat *inectis*, melle.

SUPP. II.

F

M. corpore

6.

M.

auritus. M. corpore supra rufo subtus albido, striga pone oculos remigibus recticibusque nigris.

Black-eared Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 153. 11.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 7.:—rostrum & pedes fuscis.

7.

M.

phrygius. M. niger flavo varius, macula per oculos rectricibus exterioribus flavis.

Black and yellow Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 12.—*New Holland Birds*, pl.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi*: rostrum nigrum: pedes fuscis: color pennarum niger marginibus flavis: latera capitatis macula magna flava: cauda cuneiformis, recticibus 2 intermediis toto-nigris margine flavis, exterioribus flavis.

8.

M.

cyanops. M. fuscus subtus albus, capite supra gulaque nigris, macula oculari cyanea.

Blue-cheeked Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 16.:—genae cæruleæ: rostrum nigrum: pedes cærulei.

9.

M.

garrulus. M. fuscus subtus albus, fascia verticis nigra, macula pone oculos remigibusque magna ex parte flavis.

Chattering Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 154. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Turdi*: rostrum & pedes flavi: cauda cuneiformis: inquieta & garrula avis.

10.

M.

Mona-chus. M. supra fuscus subtus albus, capite subtomentoso nigro, vertice elevato.

Cowled Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 155. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum validum subincurvatum nigrum: pedes cærulei: vertex & nucha tomento-setacea.

M. cæruleo.

11.
M.
ornatus. M. cæruleo viridique varius, nucha gula remigibusque basi fulvis, rectricibus duabus elongatis.
Variegated Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 155. 16. tab. 128.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *Erythroptero* major: per oculos vitta lata nigra, subtus cærulea: gula macula trianguli nigra: corpus subtus flavum: rostrum & pedes nigri.

12.
M.
albifrons. M. rufus subtus albidus, capite supra nigro, fronte nivea, remigibus rectricibusque maculatis.
White-fronted Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 156. 17.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 9.:—*corpus* subtus album, lineis abbreviatis obscuris: *remiges* & *rectrices* obscure cæruleæ, margine albo maculatae: *rostrum* & *pedes* fuscæ.

Femina fusca subtus fusco-albida.

13.
M.
gularis. M. niger, fronte uropygioque cæruleis, abdomine cæruleo maculato, gula rubra.
Merops *gularis*, *Nat. Hist.* pl. 337.
Red-throated Bee-eater, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 157. 18.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *Apiafrisi*: gula splendide rubra: *remiges* majores basi ferrugineæ.

GENUS XXIX. C E R T H I A.

1.
C.
coccinigas. C. viridi-aurea, pectore purpureo-amethystino coccineo vario, abdomine nigro, fasciculo subaxillari flavo.
Crimson-bellied Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 18.

HABITAT in *Africa*: longit. poll. 5 1/2:—affinis *C. Polita*.

2.
C.
venusta. C. viridi-aurea, gula purpureo-atra, abdomine pallide flavo.
Certhia *venusta*, *Nat. Hist.* 10. tab. 369.
Leona Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 19.

F 2

HABITAT

HABITAT in Africa: longit. poll. 4.:—fascicula axillaris flava ut in *C. coccinigaster*.

3.

C.

Mahratta-
tenis. *C. violaceo-purpurea*, remigibus rectricibusque exterioribus nigricanti-
bus, fasciculo subaxillari flavo.

Mahratta Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 164. 20.

HABITAT in India: affinis *C. Asiatica*.

4.

C.

melanops. *C. fusca* subtus alba, fascia per oculos ad latera pectoris utrinque nigra.
Black-eyed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 165. 21.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: longit. poll. 7—8.:—frons alba:
variat fronte fusca loris nigris; fascia sub oculis nigra.

5.

C.

tenuirof-
tris. *C. dorso cinereo*, abdomine ruso, capillito lunula gulæ remigibus
rectricibusque nigris.

Slender-billed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 165. 22. tab. 129.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. ultra poll. 6.:—rostrum tenuie,
elongatum, modice incurvum: lingua setacea: lunula gulæ nigra intus
rusa: corpus subtus album: vixitatis infestis, melle.

6.

C.

leuco-
phæa. *C. olivaceo-fusca* subtus albida, vertice nigro transversim lineato, pone
oculos macula flava.

Dirigang Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 23.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *C. familiaris*: macula
flava infra & pone oculum, altera aurantia.

7.

C.

pipilans. *C. fusco-virescens* subtus flavicans, femoribus albo fuscoque fasciatis,
remigibus rectricibusque fuscis.

Chirping Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 24.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Lusciniae*: vox pipilans:
rostrum gracile: lingua setacea.

C. nigra

8.

C.

mellivora. C. nigra lunulis striisque albidis, testricibus alarum medio rufis, cauda apice albida.

Mellivorous Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 166. 25.

HABITAT in *Nova Hollandiae* maritimis, magnitudine *Turdi*: species numerosa: inquieta avis & pugnax, visitans *Muscis*, *Melle*.

Pithecops Hematodus. valde infesta.

9.

C.

atricapilla. C. fuscovenusta subtus albida, vertice genisque nigris.

Black-headed Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 26.

HABITAT in *Nova Hollandiae*: long. poll. 6. :—rostrum modicum: lingua setacea.

10.

C.

sanguino- C. coccineo-sanguinea, dorso maculis deformatibus nigris, subtus lenta. cinerea, gula juguloque albida.

Sanguineous Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 27.

HABITAT in *Nova Hollandiae*, magnitudine *Sylviae*: rostrum & pedes nigri: lingua apice setacea.

11.

C.

dibapha. C. coccineo-rubra, abdomine albo, maculis dorsi pectoris per oculos alis caudaque nigris.

Cochineal Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 167. 28.

HABITAT in *Nova Hollandiae*: magnitudo C. Cruentata: medio pectoris maculae 6 nigrae: ale, canda, rostrum & pedes nigri: lingua setacea.

12.

C.

canescens. C. griseo-cinerea subtus rufo-alba, pectore roseo-purpurascente, remigibus testricibusque obscuris.

Hoary Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 29.

HABITAT in *Nova Hollandiae*: long. poll. 8. :—rostrum nigrum: lingua apice setacea: testricibus alarum albo maculatae.

C. Cinerea

13.

C.

pyrrhoptera. C. cinerea subtus alba, macula aurium fulva subtus nigra, remigibus
ra. medio rectricibusque exterioribus flavis.
Yellow-winged Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 30.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 7.:—remiges majores a basi
ultra medium flavæ: *uropygium* flavescens: *lingua* setacea.

Femina supra cinereo-grisea subtus flavescens, crissum maculis ferrugineis:
remiges a basi ad medium pallide ferrugineæ: vietitatis insectis.

14.

C.

agilis. C. fusca subtus alba, vertice nucha colloque supra nigris.
Agile Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 168. 31.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 6.:—*rostrum* nigrum:
lingua apice setacea: vietitatis melle, insectis.

15.

C.

cæruleo-
cens. C. fusca subtus incarnata, gula juguloque griseo-cæruleis, remigibus rec-
tricibusque cæruleo-nigris.
Cærulean Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 32.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Sylvie*: *rostrum* tenui ob-
curum.

16.

C.

chrysoptera. C. cinereo-fusca subtus alba, macula pone aures ovata aurea, alteraque,
superius nigra.
Yellow-eared Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 33.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Fringille*: *lingua* se-
tacea.

17.

C.

erythrropygia. C. fusca subtus albida, *uropygio* strigisque maxillaribus rubris.
Red-rumped Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 34.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum* & *pedes* nigri: *lingua* apice
setacea: solitaria & rara avis.

C. viridis

18.

C.

migrifrons. *C. viridis subtus flava, fronte genisque nigris.*Black-fronted Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 169. 35.HABITAT in Africa? *cauda cuneiformis.*

19.

C.

frontalis. *C. obscura, vertice dorsoque fuscous, gula uropygioque cæruleis.*
Blue-faced Creeper, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 372.HABITAT in Africa: long. poll. 5. :—*rostrum & pedes nigri.*

G E N U S XXX. T R O C H I L U S.

1.

T.

cristatellus. *T. curvirostris viridis, capitis crista viridi-nitente aurea, remigibus caudaque nigris.*Gilt-crested Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 171. 4.PARVA species, longit. 2 1/2. poll.:—*nidus papposus ut in congeneribus.**Femina supra viridi-fusca, subtus albida maculis pectoralibus nigricantibus.*

2.

T.

fulvifrons. *T. curvirostris saturate cæruleus, abdomine nigro, facie margine alarum caudaque subtus fulvis.*Orange-faced Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 172. 5.HABITATIO dubia: longit. poll. 3 1/2. :—*rostrum rectum apice adunciculum, albidum. caput postice subcristatum: corpus nigricans cæreleo varium: abdomen nigricans: macula lori, gulaque fulva: pedes nigri.*

3.

T.

maximus. *T. viridi-aureus, gula nivea, crissō ferrugineo, vertice remigibus caudaque cæruleoscentibus.**Trochilus maximus, Mus. Lefk. No. 76. t. ii. No. 2.*Great Humming Bird, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 172. 6.HABITATIO dubia: longit. poll. 8. :—*rostrum capite longius: gula nivea: cauda subulata nigricans.*

ORDO III. PASSERES.

GENUS XXXII. TURDUS.

1.
T.

- gularis. *T. fuscus subtus albus, crissō flavescente, fascia pectorali obscura.*
Penrith Ouzel, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 177. 2.

HABITAT in Cumbria: *Cinclo paulo major: pectus, abdomen, & femora lineis abbreviatis nigris*

2.
T.

- inquietus. *T. corpore supra nigro subtus albo, rostro pedibusque nigris.*
Restless Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 181. 11.

HABITAT in Nova Wallia Australi: *magnitudo Turdi musici: longit. poll. 8.:—rostrum nigrum, apice subincurvatum: cauda apice integrata.*

3.
T.

- melanops. *T. ferrugineo-fuscus, subtus cum vertice flavus, per oculos macula longitudinali nigra, intus ad imum macula parva flava.*
Black-eyed Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 181. 12.

HABITAT in Nova Hollandia: *longit. poll. 8.:—rostrum nigrum: lingua apice setacea.*

4.
T.

- dubius. *T. nigro-cærulescens subtus albus, remigibus rectricibusque fuscis.*
Doubtful Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 13.

HABITAT in Nova Hollandia: *longit. poll. 9.:—rostrum cærulescens: lingua apice setacea: corpus supra cæruleo-nigricans, subtus album: rectrices elongatae: pedes fuscii.*

5.
T.

- dilutus. *T. pallide fuscus subtus cæruleo-albus, capite collo uropygioque griseo-cærulecentibus.*
Dilute Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 14.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum* pallide fuscum: *pedes* cærulei.

6.

T.

gutturalis. *T. viridis* subitus luteus, capite nigro, gula alba.
Guttural Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. Zeyloni*: *rostrum* & *pedes* nigri: *nucha* flavescens.

7.

T.

harmonicus. *T. pallide fuscus* subitus albidus, remigibus recticibusque obscuris.
Harmonic Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 182. 16.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 9.:—*pennæ* corporis inferioris scapis fuscis: *remiges* & *rectrices* nigricantes: *rostrum* & *pedes* cornui.

8.

T.

badius. *T. badius* subitus albidus, vertice cærulecente, pectore nebuloso, remigibus recticibusque plumbeis.
Port Jackson Thrush, *White's Voy.* pl. in p. 157.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 17.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum* flavum: *pedes* fusi: *cauda* elongata apice integra.

9.

T.

prasinus. *T. cinereo-cæruleus* subitus flavescens, macula aurium ovata nigra.
Prairie Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 18.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Turdi mufici*: *rostrum* & *pedes* nigricantes: *pectrices* alarum nigro maculatæ: *gula* alba: *cauda* tota nigra.

10.

T.

volitans. *T. supra niger* subitus albus, alis fuscis, capite colloque nigris.
Volatile Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 183. 19.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 9.:—*rostrum* nigrum:
cauda elongata apice integra.

11.

T.

- cyanous. *T. viridis subtus niveus, cauda rotundata, macula oculari cærulea.*
Blue-cheeked Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longitud. poll. 12.:—*rostrum & pedes cæruleo-nigricantes: latera capitis cærulea.*

12.

T.

- tenebrosus. *T. dorso alis gulaque nigris, corpore subtus albido, vertice fusco.*
Brown-crowned Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longitud. poll. 6.:—*rostrum cærulef-
cens: pedes nigri: vertex & latera corporis fusca.*

13.

T.

- lunulatus. *T. lunulis nigris notatus, supra fuscus subtus albidus, rostro nigro, pedi-
bus pallidis.*
Lunulated Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 184. 22.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. viscivori*: *lingua apice
setacea: cauda brevis.*

14.

T.

- fuliginosus. *T. fuscō-obscurus, collo anteriore pallide griseo, pectore maculis obscu-
ris notato.*
Sooty Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 23

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. musici*: *Lingua apice
acuto: color corporis superioris obscure viridi-fuscus: cauda integra:
pedes flavi.*

15.

T.

- melano-
phrys. *T. flavo-fuscus, loris elevatis, rostro macula pone oculos pedibusque
rubris.*
Black-browed Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 185. 24.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. fuliginosi*: *loria elevata
rigida flava nigro marginata: rostrum & pedes rubri.*

T. capite

16.

T.

Muscicola. T. capite collo superiore dorsoque nigris, corpore subtus albo, alis caudaeque fuscis.

Flycatching Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 185. 25.

HABITAT in *Nova Hollandia*: longit. poll. 10.:—victitat *Muscis.*

17.

T.

cyanocephalus. T. supra fuscus subtus flavescens, vertice saturate cœruleo, rectricibus in margine albo maculatis.

Blue-headed Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 185. 26.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. musici*: rostrum cœruleum apicē nigro: rectrices apice alba: hypochondria lineis transversis numerosis notata: cauda rotundata: pedes cœrulei.

18.

T.

maxillaris. T. fuscus subtus cœruleo-albus, vertice fasciaque maxillari albis.

Maxillary Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 186. 27.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. musici*: nucha obscura cœrulea: cauda integra, apicibus rectricum albis: rostrum fuscum: pedes flavi.

19.

T.

trivolum. T. fuscus subtus rufo-albidus, fronte cinereo alboque varia.

Frivolous Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 186. 28.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. musici*: cauda modica potius abbreviata: rostrum nigrum: pedes plumbei.

20.

T.

sordidus. T. cinereo-virescens, alis caudaque nigris, macula remigum alba, rectricibus exterioribus apice albis.

Sordid Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 186. 29.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum cœrulescens: rectrices 2 intermediae cinereo-fuscæ, reliquæ albe.

21.

T.

brachypterus. T. cauda cuneiformi elongata, corpore cinereo-fusco, alis abbreviatis.

Short-winged Thrush, Gen. Syn. Sup. ii. p. 187. 30.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. myosci*: longit. poll. 10.:—*corpus supra pallide fuscum*, *subtus cinerascens*: *pectus nebulosum*: *ale abbreviatæ* vix ad caudæ basin attingunt: *rostrum & pedes nigricantes*.

22.

T.

mellinus. *T. fusco-virescens* *subtus albus*, *abdomine flavo*, *superciliis albis*, *capite & cervice nigris*.

Yellow-bellied Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 187. 31.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *T. visciviri*: *rostrum & pedes rubri*: *lingua setacea*: *gula, collum anterius & crissum alba*: *pectus & abdomen olivaceo-flava*: *latera pectoris maculis sagittatis notata*.

23.

T.

punctatus. *T. fuscus nigro punctatus*, *subtus cæruleo-albus*, *superciliis albis*, *sub oculis inacula rufa*.

Punctated Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 187. 32.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum nigrum*: *pedes flavi*: *gula alba*: *abdomen ruso-album*: *latera sub alba & crissum strigis abbreviatis nigris*.

24.

T.

asiaticus. *T. niger* *subtus flavus*, *fascia alarum duplice alba*.
Asiatic Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 188. 33.

HABITAT in *Sina*: *longitud. poll. 6.* :—*rostrum & pedes nigri*: *cæpi*
ulus ultra oculos & corpus superius nigra.

25.

T.

polioce- *T. obscurus*, *capite colloque canis*.

phalus. *Ash-headed Thrush*, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

HABITAT in insula *Norfolk Maris Australis*: *long. 7 1/4. poll.*

26.

T.

leucotis. *T. viridis* *subtus flavus*, *vertice canescente*, *jugulo pectoralique nigris*, *macula aurium alba*.

White-eared Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

HABITAT cum *T. melanope*, *cujus forte sexus alter*.

T. niger,

27.

T.

leuco-phrys. T. niger, superciliis abdomine maculaque alarum albis, femoribus albo-maculatis.

White browed Thrush, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 373.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum & pedes nigri.

GENUS XXXV. L O X I A.

1.

L.

Javensis. L. fuscō cinerea, capillitio remigibus ac rectricibus nigris, temporibus abdomineque cinereo-albicantibus.

Loxia javensis, *Mus. Carls. fast.* iv. t. 88.

Sunda Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 195. 9.

HABITAT in *Sumatra* & *Java*, magnitudine *L. Pyrrhule*: rostrum validum nigricans: pecten flavicantes: abdomen ac crissum alba.

2.

L.

cinerea. L. fuscō-nigricans, capite cristato, abdomine albido, pedibus rubris.

Loxia cinerea, *Mus. Carls. fast.* iv. t. 88.

Ash-coloured Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 196. 10.

HABITAT in insulis *Malacca*, *Sumatra*, *Java*: rostrum conico-ovatum album apice nigrum: corpus subtus album: irides rubrae: crista rostro duplo longior: alarum remiges 1. 2. 3. 4. anteriores sere aequales: cauda rotundata, rectricibus margine exteriore albidis: pedes rubri.

3.

L.

ferrugino-. L. ferruginea, rostri basi jugulo macula abdominalis alarum apice pedibus que nigris, capillitio ac cervice albicantibus. Mas.

Loxia supra ferruginea subtus cinerea, rostro & pedibus nigris, remigibus rectricibusque ferrugineo-fuscis. Femina.

Ferruginous Grosbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 196. 11.

HABITAT in *India Orientali*: rostrum cinereum subtus nigrum: caput & cervix cinereo-albida: gula jugulum cum parte pectoris superiore fuscō-nigra: remiges nigricantes: cauda brevis, sordide ferruginea: pedes atri.

Femina

Femina mentum, gula, tempora cinereo-albicantia: jugulum cinereum: cæterum ut in mare.

4.

L.

- frontalis. L. cinereo-grisea subtus alba, vertice & cervice rufescensibus.
Loxia frontalis, Daudin. Orn. ii. p. 445.
Frontal Grosbeak, Gen. Syn. Sup. ii. p. 196. 12.

HABITAT in *Senegal*, magnitudine *Fr. Anandava*: *rufrum & pedes pallide grisei: pennis sinciput & rictum oris tegentes ferrato nigrae apice albae.*

5.

L.

- mystacea. L. fuscō-olivacea subtus albida, capite & cervice rufo-fuscis, superciliis & macula oris coccineis.
Loxia mystacea, Daudin. Orn. ii. p. 446.
Mustachoe Grosbeak, Gen. Syn. Sup. ii. p. 197. 13.

HABITAT in *Cochin Sina*, magnitudine *Reguli*: longit. vix pollic. 4.:—*rufrum rufo-fuscum apice nigro: supra oculos tænia splendide coccinea & macula ejusdem ad rictum oris: pedes carnei.*

6.

L.

- cyanoptera. L. cinereo-fusca, capistro saturatiore, alis & cauda cæruleis, remigibus exterioribus basi albis:
Blue-winged Grosbeak, Gen. Syn. Sup. ii. p. 197. 14.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*, longitudine pollic. 7.:—*rufrum & pedes cærulei: remiges saturate cæruleæ, exteriores basi albis, unde macula alarum: rectrices apice albas.*

7.

L.

- fascinans. L. fusco-nigra subtus alba, rectricibus exterioribus albis.
Fascinating Grosbeak, Gen. Syn. Sup. ii. p. 197. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pyrrhulae*: *rufrum & pedes nigrantes.*

8.

L.

- bella. L. grisea nigro transversim lineata, loris nigris, rostro uropygioque rubris.
Black-lined Grosbeak, Gen. Syn. Sup. ii. p. 198. 16.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Linariae*: corpus griseofuscum lineis transversis numerosis nigris: inter rostrum & oculum macula nigra, quæ circumdat oculum & definit in acutum: pedes pallide fuscæ.

- 9.**
L.
nitida. L. lineolis transversis interruptis nigris notata, corpore supra fusco subtus albido, rostro uropygioque rubris.
Nitid Grolbeak, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 198. 17. tab. 131.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *L. bellæ*: rostrum, irides, uropygium rubra: pedes flavescentes.

GENUS XXXVII. TANAGRA.

- 1.**
T.
flavifrons. T. viridis, fronte lutea, capillitio violaceo, rostro pedibus alis caudaque nigris.
Emberiza flavifrons, *Muf. Carlf.* iv. tab. 92.
Yellow-fronted Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 204. 2.
Gula flavo-viridis: confer *Tan. Cayanam.*

- 2.**
T.
rudis. T. rostro jugulo pedibus fusco-cinereis, pectore abdomine criso ac uropygio ferrugineo-rufis, reliquis fusco-nigris.
Tanagra rudis, *Muf. Carlf.* iv. tab. 94.
Rude Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 205. 3.

HABITAT in *India Orientali.*

- 3.**
T.
ornata. T. subtus cinereo-nitens supra fusco-virescens, capillitio cervice & humeris violaceis, macula alarum aureo-lutea.
Tanagra ornata, *Muf. Carlf.* iv. tab. 95.
Showy Tanager, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 205. 4.

HABITAT in *India Orientali*: magnitudo & habitus *T. Sayacu.*

GENUS

GENUS XXXVIII. FRINGILLA.

1.

F.

leucocephala. F. fusco-rufa, capite albo, uropygio rubro, fascia pectoris lunulaque ante oculos nigris.

White-headed Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 210. 12. tab. 132.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pyrrhula*: *rostrum* rubrum: *caput & collum* totum alba: ante oculos lunula nigra: *abdomen* medium album: latera corporis nigra maculis parvis albis: *pedes* pallidi.

Variat capite cinerascente, an sexus alter.

2.

F.

calida. F. fusco-rufa, corpore supra striis longitudinalibus nigris, pedibus pallidis.

Sultry Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 210. 13.

HABITAT in *India*: longit. poll. 5 $\frac{1}{2}$.:—*rostrum* nigricans: *pennae* corporis superioris & *verticis* medio striis nigris notatae: *cauda* apice integrata: *pedes* pallide flavi.

3.

F.

nitida. F. cinerascens subtus albida, remigibus ferrugineo-flavescensibus, superciliis nigris.

Nitid Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 211. 14.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Celibis*: *rostrum* rubrum: latera corporis flavescens: supra oculos fascia nigra postice dilatata: *pedes* flavi.

4.

F.

temporalis. T. fusca subtus alba, vertice cærulecente, genis uropygioque coccineis. Temporal Finch, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 211. 15.

HABITAT in *Nova Hollandia*? regio oculorum macula ovata coccinea notata, postice dilatata: *rostrum* & *pedes* rufo-fusci.

GENUS

GENUS XXXIX. PHYTOTOMA.

1. • Pedibus tetradactylis.

- P.
Rara. *P. tetradactyla griseo-obscura, remigibus rectricibusque albo maculatis.*
Phytotoma rara, *Ind. Orn.* i. 4. 466. 1.—*Molin. Cbil.* (Fr. ed.) p. 234.
—*Daudin. Orn.* ii. p. 366. 1.
Chili Plant-cutter, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 212.

HABITAT in *Cibili*.

2. ** Pedibus tridactylis.

- P.
Abyssinica. *P. tridactyla nigra, capite gula juguloque rubris.*
Phytotoma tridactyla, *Daudin. Orn.* ii. p. 366. 2.
Loxia tridactyla, *Ind. Orn.* i. p. 397. 93.
Le Guifso Balito, *Buf. Oij.* iii. p. 471.
Three-toed Grosbeak, *Gen. Syn.* iii. p. 159.
Abyssinian Plant-cutter, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 213. tab. 133.

HABITAT in *Abyssinia, Nubia*, magnitudine *Coccotbraustis*: longit. pollic. 6.: — *caput & collum antice rubra: corpus cum ali's & cauda nigrum:* *bumeri fuscovirescentes: testrices alarum majores marginibus albidis:* *cauda forficata: pedes tridactyli fusti, digitis 2 anticis, 1 postico.*

In ave a *Buffonio descripta caput, collum, & abdominis medium usque ad crissum, rubra.*

GENUS XL. MUSCICAPA.

1. M.
auricoma. *M. olivacea, vertice corpore subtus maculaque aurium flavis, per oculos flriga alba.*
Yellow tufted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 215. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, fatis numerosa.

SUPP. II.

H

M. cinerea,

2.

M.

- australis. M. cinerea, corpore subtus & superciliis flavis.
 Southern Motacilla, *White's Voy.* tab. p. 239.
 Southern Flycatcher, *Gen. Syn.* ii. p. 219. 13.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

3.

M.

- super-
ciliosa. M. fusca, abdomine cinerascente, gula rectricibusque ferrugineis, super-
ciliis albis.
Muscicapa superciliosa, *Mus. Carls.* iv. tab. 96.
 Supercilious Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 14.

MAGNITUDO *Turdus minoris*: rectrices 2 intermediae fuscæ; reliquæ
 ferrugineæ apicibus fuscis.

4.

M.

- Meloxan- tha. M. cinerea subtus flava, vertice alis caudaque nigris, rectricibus apice
 albisi.
Muscicapa Meloxantha, *Mus. Carls.* iv. tab. 97.
 Black-crowned Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 15.

PARVA species: rectrices alarum & remiges marginibus flavis: caput
 superius nigrum.

5.

M.

- rufifrons. M. fusca, fronte dorso basique rufis, remigibus nigris, auribus
 pectoreque nigro maculatis.
 Rufous-fronted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 220. 16.

HABITAT in *Nova Wallia Australi*: magnitudo *Luscina*: cauda elongata, subcuneiformis.

6.

M.

- coccini- gastra. M. olivacea, gula alba, pectore abdomineque coccineis, fronte nigra, remigibus rectricibusque albo nigroque dimidiatis.
 Crimson-bellied Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 17. tab. 154.

HABITAT in *Nova Hollandia*: 5 1/2 poll. longa:—rostrum & pedes
 fuscescentes.

M. fusca

7.
M.

- barbata. M. fusca subtus alba, vertice maculaque gulare nigris.
Black-cheeked Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 18.

HABITAT cum priore: *remiges* margine flavescentes; *cauda* elongata.

8.
M.

- mystacea. M. virens subtus flava, tænia a rictu oris sub oculis nigra.
Mustachoe Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 221. 19.

HABITAT in *Nova Hollandia*: 8—9. poll. longa: *rostrum* gracile &
pedes nigri: *lingua* apice laciniata.

9.
M.

- rhodop-
tera. M. subcristata fusca subtus alba, remigibus medio rectricibusque a basi
ultra medium roseis.
Rose-winged Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 222. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Luscinae*: *occiput* postice
subcristatum maculis nigris.

10.
M.

- crepitans. M. cristata atro-cinerea, cauda subcuneiformi, gula striis transversis albis.
Coach-whip Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 222. 21.

HABITAT in *Nova Hollandia*: magnitudo *Turdi*: *rostrum* nigrum:
irides cæruleæ.

11.
M.

- pectoralis. M. flavo-virescens subtus flava, capite lateribus colli fasciaque pectoris
nigris, gula juguloque albis.
Black-breasted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 222. 22.

HABITAT in *Nova Hollandia*: ultra 8 poll. longa:—*stetrices* alarum
marginis flavæ: *cauda* nigra apice flavo.

12.
M.

- cucullata. M. nigra subtus alba, remigibus albo marginatis, rostro capiteque
nigris.
Hooded Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 223. 23

HABITAT in *Nova Hollandia*: *caput* tumidiusculum.

H 2

M. fusca

iii A V E S P A S S E R E S. Muscicapa.

13.

M.

rhodogaster. M. fusca subtus pallida, pectore roseo, rectricibus alarum albido marginatis.

Rose-breasted Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 223. 24.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum elongatum.

14.

M.

flavigastra. M. cinerascens subtus flava, remigibus rectricibusque obscuris.

Grey Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. 223. 25.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

15.

M.

malachura. M. fusca subtus ferruginea, gula cærulea, cauda longa cuneata rectricibus pinnulis disjunctis.

Soft-tailed Flycatcher, *Lin. Transf.* iv. p. 240. pl. 21.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 224. 26.

HABITAT in *Nova Hollandia* arundinetis: 7 poll. longa: gula femina & junioris avis cum pectore ferruginea.

16.

M.

melanocephala. M. capite colloque nigris, dorso fulvo, corpore subtus albo maculis nigris, alis caudaque fulcis.

Orange-rumped Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 225. 27.

HABITAT in *Nova Hollandia*: caput & collum tumidiuscula: caudam frequenter gerit expansam erectam.

17.

M.

cochinensis. M. olivaceo-fusca subtus rufescens, cauda cuneata, rectricibus tribus exterioribus apice albo nigroque maculatis.

Cochin Flycatcher, *Gen. Syn. Sup.* ii. Add. p. 374.

HABITAT in *Cochin Sina*: long. poll. 4 1/2.:—rostrum fuscum: pedes pallidi.

GENUS XLI. ALAUDA.

1.

A.

- Gorensis.** A. nigro-maculata ferrugineo-fusca subtus ferruginea, abdomine albo,
cauda nigricante, rectricibus extimis oblique albis.
Ferruginous Lark, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 229.

GENUS XLII. MOTACILLA.

1.

M.

- atricapilla.** M. fusco-rubra subtus alba, vertice remigibusque nigris, rectricibus
fuscis flavescente dimidiatis.
Black-crowned Wagtail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 231. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *M. alba*: rostrum & pedes
flavi.

2.

M.

- cæruleif-** cens. M. pallide cærulea, subtus flavescens, alula alba, remigibus rectricibus-
que nigris.
New Holland Wagtail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 232. 5.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *M. Cærulea*.

GENUS XLIII. SYLVIA.

1.

S.

- sylvicola.** S. virescens subtus flavescens, superciliis luteis, abdomine crissoque ni-
veis.

Motacilla Sibilatrix, *Naturf.* xxvii. p. 47. 4.

Regulus non cristatus major; *Brij. Orn.* iii. p. 482. A.—*Ind. Orn.* ii. p.
550. 8.—*Will. Orn.* p. 164.—*Ray's Letters*, p. 108. *Gen. Syn.* iv.
p. 514. E.

Larger Yellow Wren, *White's Selb.* p. 55.

Wood Wren, *Lin. Transf.* ii. p. 245. pl. 24.—*Id.* iv. p. 35.—*Gen. Syn.*
Sup. ii. p. 237. 6.

HABITAT

HABITAT in *Europa, Anglia*: 5½ poll. longa: rostrum corneum: irides avellanææ: excelsos arbores frequentat: nidificat in terra, ova ponens alba maculis minutis ferrugineis.

2.

S.

- anilis. *S. fuscescens* subtus albida, crissò flavo, iridibus rubris.
Yellow-vented Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 247. 28.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum & pedes fuscæ.

3.

S.

- fagittata. *S. nigro sagittato-striata*, corpore supra fusco subtus albo, vertice nigro stris albis, per oculos vitta ferruginea.
Streaked Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 247. 29.

HABITAT in *Nova Hollandia*, egregie cantillans: magnitudo *S. modularis*.

4.

S.

- inornata. *S. flavo-fuscescens* subtus flava, remigibus nigris, cauda apice pallida.
Terrene Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 30.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

5.

S.

- chrysops. *S. rufo-fusca* subtus alba, genis nigris, sub oculis striga flava.
Black-cheeked Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 31.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Pafferis*: lingua apice laci-nata.

6.

S.

- rufiventris. *S. cinereo-fusca*, abdomine ruso, jugulo albo, lunula pectoris cœrulea.
Rufous-vented Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 248. 32.

HABITAT in *Nova Hollandia*, præcedente paulo major.

7.

S.

- flavigastera. *S. cinereo-fusca*, corpore subtus uropygioque flavo, loris nigris.
Gold-bellied Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 33.

HABITAT cum præcedente.

+

S. cinereo-

8.

S.

- rubicata.** *S. cinereo-fusca subtus toto ferrugineo-rubra, alis caudaque fuscis.*
Ruddy Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 34.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum gracile: pedes flavi: irides avellaneous.

9.

S.

- casta.** *S. fulco-ferruginea subtus flavescens, pectore cæruleo-nebuloso, superciliis obscuris.*
Chaste Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 35.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Rubecula*.

10.

S.

- leucophæa.** *S. fusca subtus albo-cærulescens, macula remigum rectricibusque (2 intermediis exceptis) albis.*
White-tailed Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 249. 36.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

11.

S.

- rubricollis.** *S. cærulea subtus alba, jugulo pectoreque coccineo-rubris.*
Crimson-breasted Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 37.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

12.

S.

- lateralis.** *S. griseo-cærulescens subtus albida, alis uropygio rectricibusque lateralis viridibus, loris nigris.*
Rusty-sided Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 38.

HABITAT in *Nova Hollandia*, parva species magnitudine *Troglodytis*: latera corporis ferruginea.

13.

S.

- hirundinacea.** *S. corpore supra nigro, jugulo pectoreque coccineis, abdomine albo striga longitudinali nigra, criffo fulvo.*
Motacilla hyrundinacea, *Nat. Mys.* iv. pl. 114.
Swallow Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 39.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine præcedentis, cuius forte varietas.

14.

S.

verficolos. S. fusco-nebulosa subtus albo-cærulescens, rectricibus & intermediis rufis, lateralibus rubris apice albis.

Variable Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 250. 40.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

15.

S.

flammea. S. supra flammea subtus grisea, alis caudaque nigris.

Motacilla *flammea*, *Muf. Carif.* iv. tab. 98.

Flame-coloured Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 251. 41.

HABITAT in *Palmis Javæ*, magnitudine *Reguli*: rostrum & pedes nigri.

16.

S.

Pusilla. S. fusca subtus pallida, cauda prope apicem fascia fusca.

Motacilla *Pusilla*, *White's Journ.* pl. in p. 257.

Dwarf Warbler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 251. 42.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine & habitu *S. cyanæ*, cui valde affinis.

GENUS XLIV. P I P R A.

1.

P.

punctata. P. grisea fusco undulata, vertice aliquo nigris albo punctatis, rectricibus caudæ rubris.

Speckled Manakin, *Nat. Misc.* t. 111.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 253. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine congenerum: pectus rufescens: per oculos vitta albida.

2.

P.

supercilio-sa. P. castaneo-rufa subtus flavescens, superciliis albidis supra nigro marginatis, rectricibus albo maculatis.

Supercilious Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 253. 5.

HABITAT

AVES PASSERES. Hirundo.

lvii

HABITAT in *Nova Hollandia*: cauda brevis nigra, rectricibus 2 intermediiis latere, lateralibus apice albis.

3.

P.

cærulea. P. supra cærulea subtus flavescentes, vertice remigibus caudaque nigri-cantibus.

Cærulean Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 6.

MAGNITUDO præcedentis: rostrum & pedes fusci.

4.

P.

caudata. P. cærulea, vertice subcristato coccineo, aliis nigris, rectricibus 2 intermediiis elongato-acuminatis.

Long-tailed Manakin, *Nat. Misc.* pl. 153.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 7.

HABITAT in *America Meridionali*, magnitudine & forma *P. Pareole*: latera collis & cauda viridi-splendentia: rostrum fuscum: pedes pallidi.

5.

P.

gularis. P. nigro-cærulea subtus coccinea, abdomine albo.

Crimson-throated Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 254. 8.

HABITAT in insulis *Maris Pacifici*, Huabene: magnitudo *Pipre erythrocephala*: rostrum pallidum: pedes obscuri.

6.

P.

pectoralis. P. cæruleo-nigra, abdomine ferrugineo, lunula pectoris aurea.

Gold-breasted Manakin, *Gen. Syn. Sup.* ii. Add. p. 374.

HABITAT in *Brasilia*: long. poll. 4.:—rostrum & pedes pallidi.

GENUS XLVI. HIRUNDO.

I.

H.

caudacuta. H. obscura viridi-nitens, fronte gulaque albida, rectricibus apice subulatis.

Needle-tailed Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 3.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

SUPP. II.

I

H. obscura

2.

H.

- pacifica.** H. obscura, gula & uropygio cæruleo-albidis, rectricibus apice acutis.
New Holland Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, præcedenti affinis?

3.

H.

- javanica.** H. nigricans cæruleo nitens subtus cinerascens, fronte gula juguloque ferruginine, rectricibus lateribus apice macula alba.
Hirundo javanica, *Muf. Carls.* iv. t. 100.
Javan Swallow, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 259. 5.

HABITAT in *Java*: nidificat in terra.

GENUS XLVII. C A P R I M U L G U S.

1.

C.

- vittatus.** C. albidus, dorso cæruleo nebuloso, vertice fascia nuchæ nigris, remigibus rectricibusque ferrugineo-fuscis.
Banded Goatsucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 262. 3. pl. 136.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

2.

C.

- strigoides.** C. ferrugineo-fuscus, supra striis maculisque obscuris, subtus lincis fuscis, falciis teætricum tribus pallidis, superciliis albis.
Strigoid Goatsucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 262. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

3.

C.

- megacephalus.** C. cinereus maculis striisque pallidis, abdomine ferrugineo, remigibus rectricibusque albo maculatis.
Great-headed Goatsucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 263. 5.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

4.

C.

- gracilis.** C. cinereo fusco alboque varius, subtus albidus striis maculisque ferrugineo-flavis, cauda elongata.
Gracile Goatsucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 263. 6.

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*: *corpus gracile*: *rostrum validum*: *irides & pedes flavi*.

5.

C.

forficatus. C. cauda forficata, corpore nigro fusco rufo alboque vario, mandibula superiore medio crenata.

Engoulement à queue fourchue, *Levaill. Ois.* i. p. 178. pl. 47. 48.
Fork-tailed Goatfucker, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 264. 7.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *Strigis ulule*: longit. poll. 26.:-
rictus amplissimus: *cauda valde cuneiformis*: *rostrum nigrum*: *pedes flavi*.

6.

C.

macrodip- C. griseo varius, alis rufi fuscoque maculatis, penna utrinque humerali
terus. denudata longissima.

Caprimulgus macrodipterus, *Afzel. Descr. Sierr. Leon.* tab. in ditto.
Leona Goatfucker, *Nat. Mijc.* pl. 265.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 264. 8.

HABITAT in *Africa*, magnitudine *C. europæi*.

ORDO IV. C O L U M B Æ.

GENUS XLVIII. C O L U M B A.

1.

C.

melanoleuca. C. viridi-nigricans, subtus alba maculis nigris, vertice cinereo, pone
oculos macula triquetra rubra.

White-faced Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 268. 4.

HABITAT in *Nova Hollandia*, *Turture major*: *facies ultra oculos alba*
ante oculos macula nigra, pone oculos macula rubra.

2.

C.

picata. C. albo nigroque varia, facie alba, abdomine albo maculis nigris, cauda
apice alba.

Pied Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 268. 5.

HABITAT cum precedente, cuius sorte varietas.

3.
C.

Abyssinica. C. olivaceo-viridis, abdomine flavo, macula alarum purpurea, femoribus albis nigro maculatis.

Waalia Pigeon, *Bruce's Trav.* iv. p. 282. 290.—*Id. App. tab.* p. 186.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 269. 6.

HABITAT in Abyssinia, Waalia, magnitudine *domesticae*, affinis *C. Pompadura*.

4.
C.

meridio-nalis. C. rubro-fusca, rectricibus alarum minoribus purpureo-nigris, rectricibus lateralibus apice albis.

Southern Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 270. 7.

HABITAT in Nova Hollandia, magnitudine *Turturis*: cauda brevis cuneiformis, rectricibus 2 intermediis nigro-fuscis, fascia versus apicem nigra.

5.
C.

pallida. C. albo-virescens, capite cinerascente, remigibus minoribus nigro maculatis, rectricibus lateralibus apice albis.

Pale Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 270. 8.

HABITAT in Nova Hollandia.

6.
C.

Norfolciensis. C. atro-purpurea, capite colloque albis, abdomine remigibusque nigris.

Mas.

C. fusco-purpurea, dorso viridi, capite collo pectoreque ferrugineis. Femina.

Norfolk Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. Add. p. 374.

HABITAT in insula *Norfolk Maris Australis*: long. poll. 14.: *rostrum* nigrum: *pedes* rubri.

7.
C.

spadicea. C. capite colloque viridi-aureo rubentibus, humeris spadiceis, dorso alisque cærulecentibus, abdomine albo.

Chestnut-shouldered Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. Add. p. 375.

HABITAT cum præcedente: long. poll. 20.:—*rostrum* & *pedes* rubri.

8.

C.

cuneata. *C. cauda cuneata fuscens*, alis albo maculatis, capite collo pectoralibus pallide griseis.

Grey-necked Pigeon, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT in *Nova Hollandia*: long. poll. 8.:—*cauda* valde cuneiformis, *rectricibus* apice acutis, 2 intermedialis griseis, reliquis ultima mediocitate albis.

GENUS LIII*. MENURA.

Rostrum validum, conico-convexum, basi nudiusculum.

Nares ovatae medio rostri.

Rectrices elongatae pinnulis distinctis, intermediae duæ longiores angustæ, exteriores ad apicem patulae revolutæ.

Pedes robusti, ambulatorii.

I.

M.

N. Hollan. New Holland Menura, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 271*. tab. 136*.

diæ.

HABITAT in *Nova Hollandia*, a rostro ad apicem rectricum long. ped. 3 $\frac{1}{2}$.:—*rostrum* basi nudiusculum nigrum, *corpus* rufo-fuscum subtus cinerascens: *gula* rufa: *rectrices* prælongæ, scapis a basi ad medium binis, pinnulis disjunctis distantibus; intermediae 2 angustæ albidae longissimæ; exteriores basi modicæ, verius apicem revolutæ, pinnulis interioribus multo latioribus lunulis diaphanis ferrugineis, apice nigrae: *pedes* validi, obscure nigri, ungibus modice incurvatis.

Femina minor, capite levæ, 35 poll. longa: color totius avis fuscus: *cauda* cuneiformis, *rectricibus* pinnulis conjunctis.

GENUS LIV. PHASIANUS.

I.

Ph.

ignitus. *Ph. niger chalybeo-nitens*, lateribus corporis rufis, dorso imo igneo-ferrugineo, *rectricibus* intermedialis subfulvis.

Fire-backed Pheasant, *Emb. to China*, i. p. 246. tab. 13.—*Nat. Misc.* tab. 321.—*Gen. Syn. Sup.* ii. p. 274. 2.

HABITAT in *Java?* magnitudine Galli: *pedes* calcari valido instructi: *caput* pollice subcribatum.

GENUS

GENUS LVII. PERDIX.

** Pedibus tetradactylis muticis.

I.
P. **MAS.**

- coronata. *Columba cristata*, *Ind. Orn.* ii. p. 596. 10.
Phasianus cristatus, *Mus. Carls. fofc.* iii. t. 64.
 Le Roloul de Malacca, *Son. Voy. Ind.* ii. p. 174. t. 100.
 Uncommon Bird from Malacca, *Pbil. Trans.* lxiii. p. i. tab. 1.
 Violaceous Partridge, *Nat. Misc.* pl. 84.
 Lesser crowned Pigeon, *Gen. Syn.* iv. p. 622. 10. tab. 58.—*Id. Sup.* ii. p. 278. 4.

FEMINA.

- Tetrao viridis*, *Ind. Orn.* ii. p. 650. 22.
 Green Partridge, *Gen. Syn.* iv. p. 777. 21. t. 67.—*Id. Sup.* ii. p. 278. 4.

HABITAT in Sumatra.

2.
P.

- Californi- *Perdix plumbea*, *crista verticali erecta*, *gula nigra albo cincta*, *abdomine ca.* *testaceo lunulatis nigris*.
Tetrao Californicus, *Nat. Misc.* tab. 345.
 Crested Partridge of New California, *La Perouse*, *Voy.* i. p. 201?
 Californian Quail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 281. 7.

HABITAT in California, *Coturnice paulo major*: *femina* coloribus dilutoribus absque lunula gulari nigra.

3.
P.

- australis*. *P. lineis angularibus nigris*, *supra castaneo-nebulosa* *subtus flavescens*, *gula pallida*.
 New Holland Quail, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 283. 10.

HABITAT in Nova Hollanda: *7 1/2 pollices longa*: *corpus supra & infra angulatum nigro-lineatum*, *scapis pennarum albo lineatis*: *restrum nigrum*: *pedes fulvi*.

** Pedibus

4.

P.

varia. P. tridactyla mutica, corpore cinereo rufo & nigro vario subtus albido,
gula cinerascente, genis punctis parvis albis, macula aurium cœru-
lescente.

New Holland Partridge, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 283. 12.

HABITAT in *Nova Hollandia*, *Coturnice major*: *dorsum* maculis trique-
tris nigris notatum: *rostrum* corneum: *pedes* pallide flavi.

D I V. II. A V E S A Q U A T I C Æ.

O R D O VII. G R A L L Æ.

G E N U S LXVI. M Y C T E R I A.

- ^{1.}
M.
australis. M. alba, capite colloque viridi-nigris; testicibus pennis scapularibus caudaque nigris, rostro nigro, pedibus rubris.
Mycteria australis, Linn. *Transl.* v. p. 34. No. 2.
New Holland Jabiru, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 294. pl. 138.
HABITAT in *Nova Hollandia*: longitudo ab apice rostri ad extremos unguis pedes sex: *gula nudiuscula*, rubra.

- ^{2.}
M.
Senegalen- M. alba, rostro apicem versus rubro, basin versus albido fascia nigra, sis. macula utrinque feneustrata.
Mycteria Senegalenfis, Linn. *Transl.* v. p. 32. tab. 3. (caput.)
Senegal Jabiru, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 296. 3.
HABITAT in *Senegala*, magnitudine australem paulo excedens: *corpus album*: *caput, collum, penne scapulares, &c pedes nigrae*.

G E N U S LXIX. A R D E A.

- ^{1.}
A.
maculata. A. fuscescens subtus albida, dorso maculis albis, remigibus subferrugineis.
Spotted Heron, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 305. 19.
HABITAT in *Nova Hollandia*: *fatura A. minutæ*.

A. corpore

^{2.}
A.
pacifica. A. corpore supra obscuro viridi & cupreo splendente subtus albido, capite colloque albidis.

Pacific Heron, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 305. 20.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

G E N U S L X X I . N U M E N I U S .

^{1.}
N.
vociferus. N. plumbeus albo maculatus, cauda cuneata, rectricibus extimis albis.
Ephouskyca, Crying Bird, *Bart Trav.* p. 145. 291.
Crying Curlew, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 306. 2.

HABITAT in *Georgia Americana*, magnitudine *Gallinae*.

G E N U S L X X I I . S C O L O P A X .

^{1.}
S.
australis. S. corpore scolopacino, cervice nebulosa, genis & collo albidis, lateribus corporis maculis lunatis fuscis.
New Holland Snipe, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 310.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

G E N U S L X X I I . T R I N G A .

^{1.}
T.
canadensis. T. cinereo-obscura, jugulo cinerascente, abdomine albo lateribus maculato, pedibus flavis.
Quebec Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 313. 7.

HABITAT in *Canada*: magnitudo *Turdi musicus*.

^{2.}
T.
lobata. T. carunculata armata olivaceo-ferruginea subtus alba, vertice nigro, remigibus rectricibusque nigris.
Wattled Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 313. 8.

SUPP. II.

K

HABITAT

HABITAT in *Nova Hollandia*: 19 polices longa: rostrum pallidum: pedes obcuri segmentis roseis: femora rosea: ad flexuram ale spina flava.

3.

T.

- auita.** T. ferrugineo-cinerea lineis transversis albidis, subtus nebulosa pallida, superciliis albis, macula aurium fusca.
Brown-eared Sandpiper, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 314.

HABITAT in *Nova Hollandia*.

G E N U S LXXXIV. C H A R A D R I U S.

1.

C.

- canianus.** C. fuscus, fronte collari abdomineque albis, vitta per oculos laterilibusque pectoris nigris.
Kentish Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 316. 3.

HABITAT in *Eurepa, Anglia*, magnitudine & facie *Cb. Hiaticula*, at distincta avis: vertex fuscocerrugineus: rostrum & pedes nigri.

2.

C.

- magnirof-** C. rostro dilatato, corpore nigro striato supra cærulecente subtus cinerascente, macula remigum alba.
Great-billed Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 319. 8.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Cb. Pluvialis*; rostrum validum, latum, nigrum: pedes cærulei: frons & vertex maculis minutis nigrantibus.

3.

C.

- Grallarius.** C. cærulescens nigro striatus, subtus albus striis fuscis, macula aurium fusca, pedibus longissimis.
High-legg'd Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 319. 9.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum nigrum: pedes cærulescentes.

4.

C.

- fuscus.** C. nebulosus supra fuscus subtus albus, cauda nigra maculis albis.
Brown Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 10.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum nigrum: pedes plumbrei.

C. fuscus

5.
C.

- griseus. C. fuscus subtus albus, vertice nigro, alis albo maculatis.
Grilled Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 11.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum obscurum*: *pedes cærulef-centes*.

6.
C.

- frænatus. C. cærulescens fusco striatus, abdomine albo, lateribus colli vitta lata
obscura.

Bridled Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 12.

HABITAT in *Nova Hollandia*: *rostrum cærulescens*: *pedes flavi*.

7.
C.

- Africanus. C. cinerascens, capite fascia que pectoris viridibus, corpore subtus vitta-
que annulari verticis albidi.

Green-headed Plover, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 320. 13.

HABITAT in *Egypto*: habitus *Ch. melanocephali*: longitudo 8 polli-
cum: *testrices* alarum maiores albæ: *restrices* prope apicem fascia ni-
gra.

GENUS LXXIX*. C E R E O P S I S.

Rostrum breve, convexum, apice declive.

Nares cera testæ.

*Caput totum cera rugosa obtectum, ad flexuram alæ cal-
car obtusum.*

*Pedes tetradactyli fissi, femoribus seminudis, digito pos-
tico brevissimo.*

I.
C.

- N. Hol- New Holland Cereopsis, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 325. tab. 138*.
landiæ.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Anseris*: long. poll. 39.:
—*rostrum nigrum*: *caput totum ultra aures cera*, seu cute rugosa, tec-
tum: *plumæ* totius corporis cinereo-griseæ, subtus dilutiæ, maculis ali-
quot testricum nigris: *cauda rotundata retricibus 16*: *pedes & femora*

K 2

seminuda

seminuda fulva, tarsis & digitis nigris: digito exteriore basi membrana medio connexo, postico breviore vix terram attingente.

GENUS LXXX. GALLINULA.

1.

G.

poliocephala. *G. purpurea subtus viridis, capite griseo-cærulecente, remigibus caudaque cæruleis, crissi albo.*
Grey-headed Water Hen, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT in India: *rostrum* validum rubrum ut in *Porphyrione*, cui nimis affinis: *pedes* rubri.

2.

G.

madagascariensis. *G. purpureo-fusca subtus cærulea, capite griseo-cærulecente, gula pectorale humerisque viridibus.*
Grey-headed Water Hen, *Gen. Syn. Sup.* ii. *Add.* p. 375.

HABITAT in Madagascaria: an sexus alter præcedentis: *rostrum* & *pedes* rubri.

GENUS XCIV. LARUS.

1.

L.

pacificus. *L. fuscus, pectore uropygique albido, rostro fulvo prope apicem nigro.*
Pacific Gull, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 332. 2.

HABITAT in Nova Hollandia.

2.

L.

Pulo-condor. *L. cinereo-fuscus subtus albus, occipite nigro, fronte cinerea, pedibus flavis.*
Pulo-Condor Gull, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 332. 3.

HABITAT in Mari Sinensi.

GENUS

GENUS XCVII. ANAS.

I.

A.

- melano- A. albi, capite collo alis cauda femoribusque nigris.
leuca. Black and White Goose, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 344.

HABITAT in *Nova Hollandia*: avis speciosa: rostrum fulvum cera flava, ultra oculos protensa, obtectum: pedes elongati flavi, digitis vix ultra medium membrana connexis, fere ut in *A. Semipalmata*.

2.

A.

- semipal- A. grisea, capite collo femoribusque fusco-nigris, collaris uropygio cor-
mata. poreque subtus albis, pedibus semipalmatis.
Anas semipalmata, *Linn. Transf.* iv. p. 103. vi.
Semipalmed Goose, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 347. pl. 139.

HABITAT in *Nova Hollandia*, magnitudine *Anseris*: rostrum fuscum:
pedes rubri: trachea longissima circumvoluta pectus insternens, cute
folium tecta: arboribus frequenter confidet & sibilans uti *A. Penelope*
& *arborea*.

3.

A.

- jubata. A. subcristata grisea, capite colloque ferrugineis, pectore undulato, ab-
domine crisoque nigris.
Hawksbury Duck, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 358. tab. in titulo.

HABITAT in *Nova Hollandia*: pollices 17—18. æquans: rostrum &
pedes nigri: latera abdominis nigro pulchre transversim lineata: pennis
pectoris maculis parvis nigris: speculum viride anterius & posterius
album.

4.

A.

- membra- A. ferrugineo-fusca subtus alba transversim lineata, superciliis ferrugi-
naceo, rostro apice membranaceo.
New Holland Duck, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 359. 36.

HABITAT in *Nova Hollandia*: 19 pollices longa: rostrum nigrum,
apice dilatatum, membranaceum: regio oculorum & vertex cum cer-
vixe obscura.

A. tectricibus

5.
A.

Rhyncho- A. testricibus alarum cæruleis, corpore griseo, crissō nigro, pedibus pal-
tis. lidis.

New Holland Shoveler, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 359. 37.

HABITAT in *Nova Hollandia*: rostrum apice dilatatum ut in *A. dis-*
corde; an ejusdem varietas?

GENUS XCIX. PELECANUS.

I.
P.

sinensis. P. fuscus, gula alba, corpore subtus albido maculis fuscis, cauda rotun-
data.

Leu-tze, *Emb. to China*, ii. p. 388. 412. tab. 72.—*Id.* 389. tab. ad
imum.

Chinese Corvorant, *Gen. Syn. Sup.* ii. p. 364. 3.

HABITAT in *Sina* numerosissimus, ad pitium prædam adhibitus:
rostrum flavum: irides cæruleæ: cauda restringibus 12: pedes nigricantes.

CATALOGUS

NOMINUM TRIVIALIUM.

Div. I. AVES TERRESTRES.

ORDO I. ACCIPITRÆS.	23. Guianensis. 24. rufiventris. 25. hyemalis var. 26. musicus. 27. Acoli. 28. axillaris. 29. ruiculus. 30. Subbutes major. 31. Gabor. 32. minullus. 33. tibialis. 34. Jackal. 35. D-tertorum. 36. Nifus.	30. nudipes. 31. Phalenoides. 32. Tengmalmi var. 33. Sinenis. 34. undulata.	ORDO II. PICÆ.
GENUS L. <i>Vultur.</i>	1. <i>Auricularis.</i> 2. <i>Kolbi.</i> 3. <i>au-tax.</i> 4. <i>Californianus.</i>	29. <i>rufiventris.</i> 30. <i>Subbutes major.</i> 31. <i>Gabor.</i> 32. <i>minullus.</i> 33. <i>tibialis.</i> 34. <i>Jackal.</i> 35. <i>D-tertorum.</i> 36. <i>Nifus.</i>	GENUS IV. <i>Lanius.</i>
GENUS II. <i>Falco.</i>	1. <i>vulturinus.</i> 2. <i>bili-ofus.</i> 3. <i>occipitalis.</i> 4. <i>Albicilla var.</i> 5. <i>tigrinus.</i> 6. <i>Germanicus.</i> 7. <i>Defructor.</i> 8. <i>albeficens.</i> 9. <i>ecaudatus.</i> 10. <i>Bacha.</i> 11. <i>Tachardus.</i> 12. <i>Chicquera.</i> 13. <i>Paradicus.</i> 14. <i>Buzon.</i> 15. <i>Buzarellus.</i> 16. <i>melanopterus.</i> 17. <i>vocifer.</i> 18. <i>Blagrus.</i> 19. <i>ranivorus.</i> 20. <i>tephaceus.</i> 21. <i>ornatus.</i> 22. <i>Mauduyti.</i>	37. <i>Iachiro.</i> 38. <i>Sonninenis.</i> 39. <i>melanops.</i> 40. <i>radiatus.</i> 41. <i>counvens.</i> 42. <i>discolor.</i> 43. <i>pacificus.</i> 44. <i>lanulatus.</i> 45. <i>clarus.</i>	1. <i>collaris.</i> 2. <i>Collurio.</i> 3. <i>picatus.</i> 4. <i>torquatus.</i> 5. <i>dubius.</i> 6. <i>robustus.</i> 7. <i>erectus.</i> 8. <i>frontatus.</i> 9. <i>Bavigalster.</i> 10. <i>rubiginosus.</i> 11. <i>Afer.</i> 12. <i>myiaceus.</i> 13. <i>pendens.</i> 14. <i>superciliosus.</i> 15. <i>Brubru.</i> 16. <i>Cubla.</i>
GENUS III. <i>Strix.</i>	1. <i>palustris.</i> 2. <i>albifrons.</i> 3. <i>candida.</i> 4. <i>Choucou.</i> 5. <i>Niuella.</i> 6. <i>Huiula.</i> 7. <i>griseata.</i> 8. <i>Georgica.</i> 9. <i>Boobook.</i>	GENUS V. <i>Pithecatus.</i>	1. <i>Tabuenensis var.</i> 2. <i>Narcissus.</i> 3. <i>pallidus.</i> 4. <i>eximius.</i> 5. <i>pulchellus.</i>

Ixxii CATALOGUS NOMINUM TRIVIALIUM.

5. pulchellus.
6. discolor.
7. pyrrhopterus.
8. nigricollis.
9. verticalis.
10. funereus.
11. Levallanti.
12. solitarius.
13. galeatus.
- GENUS IX.**
Buceros.
1. Abyssinicus.
2. ruber.
3. galeatus.
- GENUS XI.**
Musophaga.
1. violacea.
- GENUS XIII.**
Corvus.
1. melanops.
2. melanogastrus.
3. Caledonicus.
4. versicolor.
5. cyanoleucus.
6. melanoleucus.
7. olivaceus.
8. rufogaster.
9. varians.
10. Paradoxus.
- GENUS XIV.**
Coracias.
1. fuscata.
2. Tibicens.
3. militaris.
4. pilosa.
5. leucomata.
6. pacifica.
- GENUS XV.**
Oriolus.
1. Cartagenensis.
- GENUS XVI.**
Gracula.
1. Abyssinica.
2. viridis.
3. melanocephala.
4. picta.
5. c. anotis.
- GENUS XVIII.**
Trogon.
1. Leverianus.
- GENUS XX.**
Cuculus.
1. cupreus.
2. clamofus.
3. c. anencephalus.
4. phasianinus.
5. paluolarus.
6. babelliformis.
7. pagodus.
8. Abyssinicus.
- GENUS XXI.**
Picus.
1. isterocephalus var.
2. altilorans.
3. Mahraenfis.
4. pectoralis.
- GENUS XXIV.**
Alcedo.
1. Azures.
- GENUS XXV.**
Sitta.
1. Chrysopelea.
- GENUS XXVI.**
Todus.
1. Rubecula.
- GENUS XXVII.**
Merops.
1. superbus.
2. orientalis.
3. carulefens.
4. cucullatus.
5. chrysopterus.
6. auritus.
7. Phrygius.
8. cyanops.
9. Garrulus.
10. Monachus.
11. ornatus.
12. albifrons.
13. gularis.
- GENUS XXIX.**
Certhia.
1. coccinigula.
2. venusta.
3. Mahraenfis.
4. m. la. opis.
5. tenuirostris.
6. leucophaea.
7. pipilans.
8. melivora.
9. atricapilla.
10. languiolenta.
11. dibapha.
12. canescens.
13. pyrrhopera.
14. agilis.
15. carulefens.
16. chrysotis.
17. erythropygia.
18. migrifrons.
19. frontalis.
- GENUS XXX.**
Trochilus.
1. cristellus.
2. solitrons.
3. maximus.
- ORDO III.**
PASSERES.
- GENUS XXXII.**
Turdus.
1. gularis.
2. inquietus.
3. melanops.
4. dubius.
5. dilutus.
6. gutturalis.
7. harmonicus.
8. badius.
9. prasinus.
10. volitans.
11. cyanous.
12. tenebrosus.
13. lunulatus.
14. fuliginosus.
15. melanophris.
16. Municola.
17. cyanocephalus.
18. maxillaris.
19. frivulus.
20. fordidat.

CATALOGUS NOMINUM TRIVIALIUM. Ixxiii

- 20. *fordidus.*
- 21. *brachypterus.*
- 22. *melinus.*
- 23. *punctatus.*
- 24. *afanticus.*
- 25. *poliocephalus.*
- 26. *leucotis.*
- 27. *leucophrys.*

GENUS XXXV.

Loxia.

- 1. *Javenensis.*
- 2. *cineræa.*
- 3. *ferruginosa.*
- 4. *frontalis.*
- 5. *mylacea.*
- 6. *cyanoptera.*
- 7. *fascinans.*
- 8. *bella.*
- 9. *nitida.*

GENUS XXXVI.

Tanagra.

- 1. *flavifrons.*
- 2. *rufis.*
- 3. *ornata.*

GENUS XXXVII.

Fringilla.

- 1. *leucocephala.*
- 2. *calida.*
- 3. *nitida.*
- 4. *temporalis.*

GENUS XXXVIII.

Phytotoma.

- 1. *Rara.*
- 2. *Abyssinica.*

GENUS XL.

Muscicapa.

- 1. *auricoma.*
- 2. *australis.*
- 3. *superciliosa.*
- 4. *meloxantha.*
- 5. *rufifrons.*
- 6. *coccinigaster.*
- 7. *barbata.*

SUPP. II.

- 8. *mystacea.*
- 9. *rhodoptera.*
- 10. *crepitans.*
- 11. *pectoralis.*
- 12. *cucullata.*
- 13. *rhodogaster.*
- 14. *flavigaster.*
- 15. *malachura.*
- 16. *melanocephala.*
- 17. *Cochinensis.*

GENUS XLI.

Alauda.

- 1. *Gorenfisi.*

GENUS XLII.

Motacilla.

- 1. *atricapilla.*
- 2. *ceruleiceps.*

GENUS XLIII.

Sylvia.

- 1. *Sylvicola.*
- 2. *anilis.*
- 3. *agittata.*
- 4. *inornata.*
- 5. *chrysops.*
- 6. *rufulensis.*
- 7. *flavigaster.*
- 8. *rubricata.*
- 9. *cafla.*
- 10. *leucophrys.*
- 11. *rubricollis.*
- 12. *lateralis.*
- 13. *hirundinacea.*
- 14. *versicolora.*
- 15. *flamma.*
- 16. *Pusilla.*

GENUS XLIV.

Pipra.

- 1. *punctata.*
- 2. *superciliosa.*
- 3. *cerulea.*
- 4. *caudata.*
- 5. *gularis.*
- 6. *pectoralis.*

GENUS XLVI.

Hirundo.

- 1. *caudacuta.*
- 2. *pacifica.*
- 3. *Javanica.*

GENUS XLVII.

Caprimulgus.

- 1. *vittatus.*
- 2. *fligoides.*
- 3. *megacephalus.*
- 4. *gracilis.*
- 5. *turcicus.*
- 6. *macropterus.*

ORDO IV.

COLUMBÆ.

GENUS XLVIII.

Columba.

- 1. *melanoleuca.*
- 2. *picata.*
- 3. *Abyssinica.*
- 4. *meridionalis.*
- 5. *palida.*
- 6. *Norfolkensis.*
- 7. *spadicea.*
- 8. *cuneata.*

GENUS LIII*.

Menura.

- 1. *N. Hollandiae.*

GENUS LIV.

Phasianus.

- 1. *ignitus.*

GENUS LVII.

Perdix.

- 1. *coronata.*
- 2. *Californica.*
- 3. *australis.*
- 4. *varia.*

L DIV. II.

lxiv. CATALOGUS NOMINUM TRIVIALIUM.

DIV. II. AVES AQUATICÆ.

ORDO VII. GRALLÆ.	GENUS LXXXII. Tringa.	GENUS LXXX. Gallinula.
GENUS LXVI. Mycteria.	1. Canadensis. 2. lobata. 3. aerata.	1. poliocephala. 2. Madagascariensis.
1. acutalis. 2. Senegalenfis.	GENUS LXXIV. Charadrius.	GENUS XCIV. Larus.
GENUS LXIX. Ardea.	1. Cantianus. 2. magnirostris. 3. grallarius. 4. fuscus. 5. griseus. 6. fumatus. 7. Africanus.	1. Pacificus. 2. Pulo-condor.
GENUS LXXI. Numenius.	GENUS LXXIX*. Cereopsis.	GENUS XCVII. Anas.
1. vociferus.	1. N. Hollaadiæ.	1. melanoleuca. 2. femipalmata. 3. jubata. 4. membranacea. 5. rhynchotis.
GENUS LXXII. Scolopax.		GENUS XCIX. Pelecanus.
1. australis.		1. Sinensis.

F I N I S.

Luke Hanford, Printer,
Great Turnstile, Lincoln's-Inn Fields